

शिव सागरमोती अँग्रोटेक, अकोला

पिक : हरभरा

वाण : जॉकी - ९२१८

अनु. क्र.	विवरण	तपशील
01	पिकाच्या वाणास योग्य कृषी विभाग	रब्बी हंगाम 10, 11, 12
02	जमिनीची निवड व जमिनची मशागत	मध्यम ते भारी जमीन,पुर्वीचे पीककाढल्यानंतर जमीन नांगराने वखारच्या उभ्या आडव्या पाळ्या देवून जमीन भुसभुशीत करावी.
03	बिज प्रक्रिया वेळ / रासायनिक औषधे	थायरम 3 ग्रॅम / किलो बियाण्याला लावून करावी.
04	पेरणीची वेळ	ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात करावी.
05	पेरणीकरिता लागणारे बियाणे-पेरणीची पध्दत (दोन ओळीतील व दोन रोपांमध्ये अंतर ठेवून / पेरणी)	50 ते 60 किलो/हेक्टर दोन झाडातील अंतर 10 सें.मी. व दोन ओळीतील अंतर 30 सें.मी. ठेवून पेरणी सरत्याने करावी.
06	रासायनिक खते मात्रा व खत देण्याचा कालावधी व वेळ	नत्र 20 किलो व स्फुरद 40 किलो/हेक्टर हे पेरणीच्या सोबत द्यावे.
07	तण नियंत्रण - रासायनिक औषध व मात्रा व वेळ	फल्युक्लोरॅलनी (बासालीन 45 % इ.सी. क्रियाशील घटक 0.75 -1.0 किलो प्रति हेक्टर पेरणीपूर्वी फवारावे.
08	रोग व किड नियंत्रण रासायनिक औषध मात्रा व वेळ	घाटे अळी - निंबोळी अर्क 5 % टक्के किंवा इन्डोसल्फान 35 % प्रवाही 29 मि.ली. किंवा क्विन्तॉलफॉस 25% प्रवाही 29 मि.ली. 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
09	पाणी देण्याचे वेळापत्रक	गरजेनुसार 10 ते 15 दिवसांनी देणे
10	पिक काढण्याचा तपशील	105 ते 110 दिवस
11	वाणाचे गुणवत्ता विषयक गुणधर्म	मर रोग प्रतिबंधक, टपोरा, पिवळा कलरचा दाणा
12	अपेक्षित उत्पन्न	20 ते 25 क्विंटल प्रति हेक्टर