

शिव सागरमोती अँग्रोटेक, अकोला

पिक : गहू

वाण : एचडी - 2189

अनु. क्र.	विवरण	तपशील
01	पिकाच्या वाणास योग्य कृषी विभाग	या पिकाला थंड हवामान मानवते
02	जमिनीची निवड व जमिनची मशागत	बागायती गव्हास पाण्याचा निचरा होणारी मध्यम ते भारी प्रतीची जमीन निवडावी खरीप पिकानंतर खोल नांगरती करून व वखरच्या तीन ते चार पाळ्या देवून जमीन भुसभुशीत करावी उताराला आडवे सारे पाडून पेरणीसाठी जमीन तयार ठेवावी.
03	बिज प्रक्रिया वेळ / रासायनिक औषधे	3 ग्रॅम थायरम /किलो आणि अँझोटोबॅक्टर हे नत्रस्थिरीकरण करणारे जिवाणु व पी.एस.बी. 250 ग्रॅम / 10 ते 15 किलो बियाण्यास पेरणीपुर्वी चोळून लावल्यास उत्पादनात वाढ मिळेल.
04	पेरणीची वेळ	ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर
05	पेरणीकरिता लागणारे बियाणे-पेरणीची पध्दत (दोन ओळीतील व दोन रोपांमध्ये अंतर ठेवून / पेरणी)	100 किलो / हेक्टर, दोन ओळीतील अंतर 23 सें.मी ठेवावे व बियाणे 5 ते 6 सें.मी. पेक्षा खोल पडणार नाही.
06	रासायनिक खते मात्रा व खत देण्याचा कालावधी व वेळ	100 ते 120 मि.ली नत्र 50 ते 60 मि.ली. स्फुरद व 50 ते 60 किलो पालश एवढ्या रासायनिक मात्रा खताची द्यावी.
07	तण नियंत्रण - रासायनिक औषध व मात्रा व वेळ	आयसोप्रोटोरॉन (ग्रॅमिनाॅन 50 % डब्ल्यु पी) 2.0 लि. हेक्टर उगवणपुर्वी किंवा उगवण पश्चात 30 ते 40 दिवसानंतर फवारावे.
08	रोग व किड नियंत्रण रासायनिक औषध मात्रा व वेळ	खोडकिडा - 40 ग्रॅम कार्बारील 50% पा.मि. भू अधिक 10 लिटर पाणी मिसळून फवारावे. तांबेरा-मॅन्कोझेब (डायथेन एम 45) 25 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काजळी किंवा काणी - नियंत्रणासाठी पेरणीपुर्वी बियाण्यास व्हिटॅक्स किंवा कार्बेन्डाझिम 2.5 ग्रॅम / किलो याप्रमाणे बीज प्रक्रिया करावी.
09	पाणी देण्याचे वेळापत्रक	पहिले पाणी - 18 ते 20 दिवसांनी पेरणी झाल्यानंतर, दुसरे पाणी 30 ते 35 दिवसांनी तिसरे पाणी 50 ते 56 दिवसांनी व चौथे पाणी 70 ते 80 दिवसांनी द्यावे.
10	पिक काढण्याचा तपशील	110 ते 115 दिवस
11	वाणाचे गुणवत्ता विषयक गुणधर्म	खाण्यास मऊ
12	अपेक्षित उत्पन्न	35 ते 40 क्विंटल प्रति हेक्टर