

# शिव सागरमोती अँग्रोटेक, अकोला

पिक : संशोधीत गहू

वाण : सुप्रीम 108

| अनु. क्र. | विवरण                                                                                    | तपशील                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | जमिनीची निवड व जमिनची मशागत                                                              | बागायती गव्हास पाण्याचा निचरा होणारी मध्यम ते भारी प्रतीची जमीन निवडावी खरीप पिकानंतर खोल नांगरटी करून व वखरच्या तीन ते चार पाळ्या देवून जमीन भुसभुशीत करावी उताराला आडवे सारे पाडून पेरणीसाठी जमीन तयार ठेवावी.                                                                                     |
| 02        | बिज प्रक्रिया वेळ / रासायनिक औषधे                                                        | 3 ग्रॅम थायरम /किलो आणि अँझोटोबॅक्टर हे नत्रस्थिरीकरण करणारे जिवाणु व पी.एस.बी. 250 ग्रॅम / 10 ते 15 किलो बियाण्यास पेरणीपुर्वी चोळून लावल्यास उत्पादनात वाढ मिळेल.                                                                                                                                  |
| 03        | पेरणीची वेळ                                                                              | ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04        | पेरणीकरिता लागणारे बियाणे पेरणीची पध्दत (दोन ओळीतील व दोन रोपांमध्ये अंतर ठेवून / पेरणी) | 100 किलो / हेक्टर, दोन ओळीतील अंतर 23 सें.मी ठेवावे व बियाणे 5 ते 6 सें.मी. पेक्षा खोल पडणार नाही.                                                                                                                                                                                                   |
| 05        | रासायनिक खते मात्रा व खत देण्याचा कालावधी व वेळ                                          | 100 ते 120 मि.ली नत्र 50 ते 60 मि.ली. स्फुरद व 50 ते 60 किलो पालश एवढ्या रासायनिक मात्रा खताची द्यावी.                                                                                                                                                                                               |
| 06        | तण नियंत्रण - रासायनिक औषध व मात्रा व वेळ                                                | आयसोप्रोटोरॉन (ग्रॅमिनाॅन 50 % डब्ल्यु पी) 2.0 लि. हेक्टर उगवणपुर्वी किंवा उगवण पश्चात 30 ते 40 दिवसांनंतर फवारावे.                                                                                                                                                                                  |
| 07        | रोग व किड नियंत्रण रासायनिक औषध मात्रा व वेळ                                             | खोडकिडा - 40 ग्रॅम कार्बारिल 50% पा.मि. भू. अधिक 10 लिटर पाणी मिसळून फवारावे. तांबेरा-मॅन्कोझेब (डायथेन एम 45) 25 ग्रॅम 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. काजळी किंवा काणी - नियंत्रणासाठी पेरणीपुर्वी बियाण्यास व्हिटॅब्लक्स किंवा कार्बेन्डाझिम 2.5 ग्रॅम / किलो याप्रमाणे बीज प्रक्रिया करावी. |
| 08        | पाणी देण्याचे वेळापत्रक                                                                  | पहिले पाणी - 18 ते 20 दिवसांनी पेरणी झाल्यानंतर, दुसरे पाणी 30 ते 35 दिवसांनी तिसरे पाणी 50 ते 56 दिवसांनी व चौथे पाणी 70 ते 80 दिवसांनी द्यावे.                                                                                                                                                     |
| 09        | पिक काढण्याचा तपशील                                                                      | 115 ते 120 दिवस                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10        | अपेक्षित उत्पन्न                                                                         | खाण्यास मऊ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11        | वाणाचे गुणवत्ता विषयक गुणधर्म                                                            | 45 ते 55 क्विंटल प्रति हेक्टर                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |