



5 L & 100 ml

Açık ve kapalı alanlar için güçlü formülasyon

Formülasyon Şekli: EC (Emülsiyon Konsantre)
Aktif Madde: Deltamethrin %2,5



Solfac Super EC25, Deltamethrin'in benzersiz etkisi ve özel formülasyonu sayesinde, iç ve dış alanlardaki haşerelerin kontrolü için hem alan spreyi hem de yüzey spreyi olarak kullanılabilen, geniş spektrumlu bir insektisittir.



Zararlı türü Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Seyreltme oranı	Uygulama miktarı ve aralığı
Sivrisinek - Ergin Karasinek - Ergin Tatarcık	ULV yöntemi	0,5 g a.i / ha	1 L ürün+24 L Su	0,5 L karışım / h
Sivrisinek - Ergin	Kanalizasyon sistemlerinde (Gerekli tedbirler alınması kaydıyla yalnızca kanalizasyon sistemlerinde) TF - Sıcak sisleme	1 g a.i / ha	1 L ürün+ 249 L mazot	10 L karışım / ha
Hamam Böceği	Boş kapalı alan yüzey spreylemesi	0,03 g a.i / m ²	120 ml ürün 5 L suya tamamlanır	50 mL karışım / 1 m ² alana 90 gün
Kene	Boş kapalı alan ve mesken çevresi yüzey spreylemesi	0,01 g a.i / m ²	40 ml ürün 5 L suya tamamlanır	50 mL karışım / 1 m ² alana
Pire	Boş kapalı alan yüzey spreylemesi	0,012 g a.i/m ²	48 ml ürün 5 L suya tamamlanır	50 mL karışım / 1 m ² alana
Kırmızı Tavuk Biti (Dermanyssus gallinae)	Boş kapalı alan ve mesken çevresi yüzey spreylemesi	0,012 g a.i/m ²	48 ml ürün 5 L suya tamamlanır	50 mL karışım / 1 m ² alana
Altlık Böceği (Alphitobius diaperinus)	Boş kapalı alan ve mesken çevresi yüzey spreylemesi	0,012 g a.i/m ²	48 ml ürün 5 L suya tamamlanır	50 mL karışım / 1 m ² alana

UYGULAMA ŞEKİLLERİ:

Uygulamaya başlamadan önce karışımı ÇALKALAYINIZ.

Yüzey Spreylemesi: El spreyleri veya filitler ile uygulanır. Uygulama cihazının spreyleme ucu (nozül) yüzeye 40 - 45 cm mesafede olacak şekilde püskürtme yapmak en iyi sonucu verecektir. Uygulama yapılan yüzeyleri ıslatacak kadar püskürtme yeterli olup yoğun piskürtmenin ilacın akmasına ve etkisinin hızlıca kaybolmasına sebep olacağı unutulmamalıdır.

Alan Spreylemesi: Hedef haşerenin aktif olduğu saatler göz önünde bulundurularak karasinek mücadelesi için sabahın erken saatleri, sivrisinek mücadelesi için akşam gün batımı saatlerinden sonra uygulama yapılması önerilmektedir. Uygulamanın yoğun rüzgar şartlarında veya yağmurlu dönemlerde yürütülmesi tavsiye edilmez. Hayvancılık Yapılan İşletmelerde Uygulama; ULV makinesi ile yapılacak uygulamalarda, ULV damlacıkları 8 - 30 micron aralığında olacak şekilde kalibre edilmiş makinelerle uygulama yapılmalıdır. Hayvan yemlerinin üzerine doğrudan uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan alanda, açıkta içme suyu olmamasına dikkat edilmelidir.

Yüksek kaliteli formülasyonu ile yaşam alanları, endüstriyel alanlar ve çiftlik alanlarında birçok zararlıya karşı etkinlik sağlar.

Hedef zararlı ve uygulama yapılacak ortama göre, hem alan spreyi hem de yüzey spreylemesi şeklinde uygulanabilir. Birden fazla ürün ihtiyacını ortadan kaldırarak, daha ekonomik bir çözüm sunar.

Yürüyen ve uçan haşerelere karşı etkili



Karasinek



Sivrisinek



Tatarcık



Hamam Böceği



Pire



Kene



Altık Böceği