

LOGIQUE ET RAISONNEMENT

Exercice 1 Vrai ou faux ? Justifier.

- $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \geq 3$;
- $\forall x, y \in \mathbb{R}^*, x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$;
- $\exists x \in \mathbb{R}_+, x < \sqrt{x}$;
- $\forall x, x' \in \mathbb{R} \setminus \{1\}, x \neq x' \implies \frac{x+1}{x-1} \neq \frac{x'+1}{x'-1}$;
- $\forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k \geq N$;
- $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x \geq 0 \implies x \geq 0$.

Exercice 2 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Écrire avec des quantificateurs les propositions suivantes :

- f est périodique;
- f est majorée;
- f est constante;
- f est croissante;
- f possède un minimum;
- f prend des valeurs aussi grandes que l'on veut;
- f s'annule au plus une fois.

Exercice 3 Soient I un intervalle non vide de \mathbb{R} et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Exprimer les négations des assertions suivantes :

- $\forall x \in I, f(x) \neq 0$;
- $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) = y$;
- $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$;
- $\forall x, y \in I, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$;
- $\forall x, y \in I, f(x) = f(y) \implies x = y$;
- $\forall x \in I, f(x) > 0 \implies x \leq 0$.

Exercice 4 (raisonnement direct) Démontrer que :

- $\forall x, y \in \mathbb{R}, xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$;

- $\forall x \in [0, 1], \forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq x^n - x^{n+1} \leq 1$;
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$;
- $\forall a, b \in \mathbb{R}_+, \sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$;
- $\forall a, b \in \mathbb{R}_+, (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$.

1 Disjonction de cas

Exercice 5 Montrer que, pour tout entier relatif n , le nombre $n^4 - n + 2022$ est un entier pair.

Exercice 6 Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - x + 1 \geq |x - 1|$$

Exercice 7 Montrer que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad \max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}$$

2 Raisonnement par l'absurde ou par contraposition

Exercice 8 1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Démontrer que :

$$(\forall \varepsilon > 0, |x| \leq \varepsilon) \implies x = 0$$

2. Montrer que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (x \neq 1 \text{ et } y \neq 1) \implies (xy - x - y \neq 1)$$

3. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n^2 \text{ est un multiple de } 6) \iff (n \text{ est un multiple de } 6)$$

Exercice 9 On admet que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{Q}, \quad x + \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Exercice 10 Montrer qu'il n'existe pas de polynôme P à coefficients réels tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = P(x)$$

3 Récurrences

Exercice 11 1. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$$

2. Déterminer un nombre réel x non entier vérifiant la propriété : $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

Exercice 12 Pour tout entier naturel n , comparer les quantités $(n+1)!$ et 2^n .

Exercice 13 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, considérons la propriété \mathcal{P}_n : « l'entier $8^n + 1$ est divisible par 7 ».

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\mathcal{P}_n \implies \mathcal{P}_{n+1}$.
2. Que peut-on en déduire ?

Exercice 14 On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par récurrence comme suit :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + 3u_n \end{cases}$$

1. Déterminer les racines ψ et $\bar{\psi}$ du polynôme $X^2 - X - 3$.
2. Démontrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{\psi^n - (\bar{\psi})^n}{\psi - \bar{\psi}}$$

Exercice 15 (inégalité de Bernoulli) Démontrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (1+x)^n \geq 1+nx$$

Exercice 16 À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1},$$

où $\sum_{k=1}^n a_k$ correspond à la somme $a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

Exercice 17 Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par $u_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$$

Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le terme général u_n en fonction de n .

Exercice 18 Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \exists a_n, b_n \in \mathbb{N}, \quad (1+\sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$$

Exercice 19 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $a_0 = a_1 = 1$ et par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{a_n}{n+1}$$

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 1 \leq a_n \leq n^2$$

Exercice 20 À l'aide d'une récurrence forte, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \exists p, q \in \mathbb{N}, \quad n = 2^p(2q+1)$$

4 Analyse-synthèse

Exercice 21 Déterminer les nombres réels x tels que $\sqrt{2-x} = x$.

Exercice 22 Déterminer les fonctions impaires $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f-1$ soit paire.

Exercice 23 Déterminer les solutions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de l'équation fonctionnelle suivante :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(y) = 2f(x-y) + 1$$

Exercice 24 On note \mathcal{A} l'ensemble des fonctions affines et \mathcal{B} l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables sur \mathbb{R} telles que $f(0) = f'(0) = 0$. Montrer que toute fonction dérivable de \mathbb{R} dans \mathbb{R} est la somme, d'une et une seule manière, d'une fonction de \mathcal{A} et d'une fonction de \mathcal{B} .