Germisol

ANTISÉPTICO GERMICIDA

FIX CURACIÓN DE HERIDAS

Ficha Técnica

SOLUCIÓN PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS

TRIYODOFENOL 60% ALTO RENDIMIENTO

Descripción : Solución Hidro-Alcohólica, color rojo/ambar que elimina microorganismos pátogenos multiresistentes, coagula y cicatriza. Desinfecta de adentro hacia afuera. Estimula el tejido para su regeneración. Evita la proliferación de otros patógenos. Ataca Gram+ Gram- protozoarios.

Características y Especificaciones

-Solución pura, que no pigmenta.
-Contiene una molécula antimicrobiana poderosa Biosegura.
-Es compatible con todos los tejidos
-No deja residuos y es 100% absorbible
-Efecto de residualidad máximo de 7 horas dependiendo temp. ambiente.
-Tiene una vida útil de 10 años
-Capaz de soportar altas y bajas temperaturas -5º C, 50º C.
-Almacenamiento lugar seco y fresco.
-Fórmula estable conforme a normas internacionales.
-Efecto antimicrobiano hasta que la solución se absorba en tejidos.
-Solución que puede esterilizar prótesis al instante.

Mecanismos de Acción

-Actúa directamente desinfectando, coagulando y cicatrizando.
-Ataca sólamente microorganismos patógenos
-Estimula desbridamiento en las heridas contaminadas.
-Estimula la regeneración del tejido, desinfecta de adentro hacia afuera.

Germisol

ANTISÉPTICO GERMICIDA

FIX CURACIÓN DE HERIDAS

Modo de Empleo

. Aplicar directamente en tejidos infectados o no infectados
-Excelente para lavados mecanicos pre-aplicación de kit FIX-Q.
-Evita que patogenos se reproduzcan
-Aplicar después de la debridación o retiro de tejido necrosado.

Indicaciones

-Heridas de espesor parcial y total.
-Ulceras Pie diabético.
-Lesiones en tejido óseo.
-Lesiones en piel y tejido muscular.
-Aplicación en injertos y prótesis, antes y despúes de su colocación.
-Quemaduras de primero y segundo grado.
-Heridas post quirúrgicas.

Contraindicaciones

-Pacientes alergicos a componentes de la fórmula.
-No usar en combinaciones con apositos secundarios que contengan metales como: plata, bismuto o zinc.
-No aplicar intravenoso, no inyectable.
-No aplicar en medula ósea ni tejido nervioso.

Normas Internacionales:

Pseudomonas aeruginosas ATCC15442-2ATCC-6538 Escherichia coli ATCC11229. Staphylococcus aureus ATCC6538. Cándida albicans ATCC10231. Salmonella typhi Sp. ATCC 6539 Bordetella bronchiséptica ATCC4617. Streptococcus faecalis ATCC8043. Proteusmirabilis. Shigellaflexneri. PRUEBA DE IRRITABILIDAD (Método- NOM-039-SSA-I-1993) Resultado: No Irritante (no produce edema ni eritema) PRUEBA DE ESTABILIDAD (Informe No.A-796-2000) Resultado: Estable DOSIS LETAL PROMEDIO (DL50) Resultado: Prácticamente no tóxico.REG. COFEPRIS 01343C2000 SSA.

Germisol

ANTISÉPTICO GERMICIDA





FIX CURACIÓN DE HERIDAS