



## **OVAIOLA Tre - Mélange certifié Biologique**

**Prix à la tonne : communiqué chaque mois par mail ou sur demande**

**Peut être utilisé en agriculture biologique conformément au Règlement UE 848/18**

Composition :

<b>Composant</b>
Mais
Blé
Tourteau de soja
Carbonate de calcium frantumé
Son de blé
Farine de tournesol
Orge
Phosphate bicalcique
Chlorure de sodium
Acide formique
Formiate de sodium
Bicarbonate de sodium

**En % sur la substance sèche :**

- Biologique : 87,0 %
- Conventiennelle : 0,0 %
- Non agricole : 13,0 %
- En conversion : 0,0 %
- Origine agricole : 87,0 %



Composants Analytiques par Kilogramme :

Composant	Pourcentage/Masse (g)
Fibre brute	4,45 %
Graisses brutes	3,72 %
Phosphore	5,97 g
Cendres brutes	14,30 %
Lisine	7,46 g
Calcium	42,40 g
Protéine brute	16,30 %
Méthionine	3,20 g
Sodium	1,61 g

Autres Suppléments :

- Vitamine A (Acétate de rétinyle) : 8 000,00 UI
- Vitamine D3 (Cholécalciférol) : 3 200,00 UI
- Bétaïne anhydre : 1 167,00 mg
- Biotine : 0,04 mg
- Chlorure de choline : 476,00 mg
- Acide folique : 1,00 mg
- Niacinamide : 25,00 mg
- Calcium D-pantothénate : 7,28 mg
- Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) : 0,75 mg
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine) : 0,02 mg
- Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) : 1,60 mg
- Vitamine E (Tout-rac-alfa-tocophéryle acétate) : 18,50 mg
- Vitamine K3 (Menadione nicotinamide bisulfite) : 2,50 mg
- Cuivre (Sulfate de cuivre-II pentahydraté) : 10,00 mg
- Iode (Iodate de calcium anhydre) : 1,50 mg
- Fer (Sulfate de fer-II monohydraté) : 44,00 mg
- Manganèse (Oxyde de manganèse-II) : 88,60 mg
- Sélénium (Sélénite de sodium) : 0,25 mg
- Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) : 50,00 mg
- Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 : 1 500,00 UV
- Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 : 1 100,00 UV
- Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 : 216,00 U
- Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 : 64,00 U
- Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 : 56,00 U
- Sepiolite : 1 059,00 mg
- Bentonite : 297,50 mg

Instructions d'Utilisation :

Administrer à volonté aux poules en période de ponte, en laissant de l'eau fraîche à disposition.



**Précautions :**

- Éviter l'utilisation simultanée par voie orale avec des macrolides.
- Éviter l'utilisation simultanée avec de la robenidine.
- Éviter l'utilisation simultanée avec de l'eau de boisson contenant du chlorure de choline.
- Ne pas utiliser simultanément avec de la vitamine D2.