AMINOÁCIDOS

Todas as proteínas são compostas por aminoácidos

- 20 aminoácidos (padrão, primários ou normais)
- Todos apresentam um grupo AMINO e um grupo CARBOXILA ligados ao mesmo átomo de carbono – **CARBONO α**
- Exceto para a glicina, o carbono α é assimétrico, ligado a 4 grupos diferentes:

Isomeria

Estrutura dos
Aminoácidos

Comparada

Estrutura do
Gliceraldeído

Convenção de Fisher (1891)

L-Gliceraldeído

D-Gliceraldeído

Estereoisômeros ou Enantiômeros

Isomeria

L- Gliceraldeído

L-aminoácido

D-aminoácido

Isomeria

(a)

(b)

Ocorrência dos isômeros

L-aminoácido

**Maioria da
proteínas**

D-aminoácido

Alguns antibióticos e em peptídios
presentes em bactérias

Gramicidina S
Antibiótico de *Bacillus brevis*

Isomeria

Aminoácidos → Moléculas assimétricas → Óticamente ativas

Moléculas não sobreponíveis = imagens especulares
Física e quimicamente indistinguíveis
Giram o plano de luz polarizada em direções opostas

CLASSIFICAÇÃO DOS AMINOÁCIDOS

O papel que os aminoácidos desempenham nas proteínas está relacionado às **propriedades químicas dos radicais**

APOLARES
(hidrofóbicos)

GRUPO I

POLARES
(hidrofílicos)

GRUPO II

GRUPO III

AMINOÁCIDOS APOLARES

Glycine (Gly)

Alanine (Ala)

Valine (Val)

Leucine (Leu)

Isoleucine (Ile)

Methionine (Met)

Phenylalanine (Phe)

Tryptophan (Trp)

Proline (Pro)

AMINOÁCIDOS POLARES NÃO-CARREGADOS

Serine (Ser)

Threonine (Thr)

Cysteine (Cys)

Tyrosine (Tyr)

Asparagine (Asn)

Glutamine (Gln)

ESTRUTURA DA CISTINA

AMINOÁCIDOS POLARES CARREGADOS

AMINOÁCIDOS NÃO-PADRÃO

- Também denominados não-primários ou incomuns
- São derivados dos aminoácidos padrão, geralmente após a cadeia polipeptídica ter sido sintetizada.
- As modificações incluem adição de pequenos grupos químicos: OH, CH₃, COOH, entre outros.
- Exemplos:
 - 4-hidroxiprolina: derivado da prolina com uma hidroxila no carbono 4
 - 5-hidroxilisina: derivado da lisina com uma hidroxila no carbono 5 } Colágeno
- N-metilisina: derivado da lisina com um grupo metil ligado ao grupo amina: encontrado na miosina, proteína contrátil dos músculos
- γ -carboxiglutamato: encontrado na protrombina, proteína importante na coagulação sanguínea.
- Desmosina: um derivado com quatro resíduos de lisina encontrado na elastina
- Selenocisteína: um átomo de selênio encontrado no lugar da hidroxila da serina: encontrado em algumas enzimas

AMINOÁCIDOS NÃO-PADRÃO

(a)

AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS

São aminoácidos que não são sintetizados pelo corpo e que precisam ser adquiridos na dieta. Para o homem os aminoácidos essenciais são 8:

Isoleucina (Ile), Leucina (Leu), Lisina (Lys), metionina (Met), Fenilalanina (Phe), Treonina (Thr), Triptofano (Trp) e Valina (Val)

AMINOÁCIDOS NÃO-PROTEÍCOS

São encontrados nas células desempenhando muitas funções, mas nunca são encontrados fazendo parte das proteínas.
Exemplos:

Ornitina } Participam do ciclo da
Citrulina } uréia

Homocisteína: intermediário no metabolismo dos aminoácidos

Abreviaturas dos Aminoácidos

Aminoácido	Abreviaturas	
	Três letras	Uma letra
Alanina	Ala	A
Arginina	Arg	R
Asparagina	Asn	N
Asparato	Asp	D
Cisteína	Cys	C
Fenilalanina	Phe	F
Glutamato	Glu	E
Glutamina	Gln	Q
Glicina	Gly	G
Histidina	His	H
Isoleucina	Ile	I
Leucina	Leu	L
Lisina	Lys	K
Metionina	Met	M
Prolina	Pro	P
Serina	Ser	S
Treonina	Thr	T
Triptofano	Trp	W
Tirosina	Tyr	Y
Valina	Val	V

PEPTÍDIOS E PROTEÍNAS

- Proteínas são polímeros compostos de **aminoácidos**
- **Ligação peptídica:** ligação covalente entre aminoácidos para formar os peptídios e proteínas

Estrutura de um pentapeptídio

PEPTÍDIOS

- Exemplo de uma seqüência de aminoácidos em um peptídio, mostrando as abreviações comumente utilizadas

Peptídios de importância biológica

Aspartame é o nome comercial dado para o dipeptídeo formado por fenilalanina e aspartato ligado a um grupo metil na extremidade C-terminal: L-aspartil-L-fenilalanina.

Esse peptídeo é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose.

A indústria de refrigerantes é um dos maiores mercados para o aspartame.

Aspartame

The dipeptide aspartame (Nutra Sweet[®]).

L-aspartil-L-fenilalanina (metil éster)

Peptídios de importância biológica

Quadro 2.2 Peptídios de importância biológica

Peptídios	Número de aminoácidos	Glândulas/ células produtoras	Efeitos principais
Encefalinas	5	Hipófise anterior e medula adrenal	Analgesia
Oxitocina	9	Hipófise posterior	Contração da musculatura uterina no parto e de glândulas mamárias na lactação
Vasopressina	9	Hipófise posterior	Aumento da pressão sangüínea e da reabsorção de água pelo rim
Glucagon	29	Células α do pâncreas	Aumento da produção de glicose pelo fígado no jejum
Gramicidina	10	Cepas de <i>Bacillus brevis</i>	Antibiótico
Glutationa	3	Maioria das células	Proteção de radicais $-SH$ de proteínas, manutenção do Fe^{2+} da hemoglobina e dissipação de H_2O_2

Estrutura Primária

**Ligação
Peptídica**

Estrutura Secundária

- A α -hélice é formada e estabilizada pelas **PONTES DE HIDROGÊNIO** que se formam entre átomos de duas ligações peptídicas próximas: ocorre entre o OXIGÊNIO do grupo carboxila de um aminoácido e o HIDROGÊNIO do grupo amina de outro aminoácido. Ocorrem entre uma unidade peptídica e a quarta unidade subsequente.

Estrutura Secundária - α Hélice

Estrutura Secundária – Folha β

Overhead transparencies to accompany Garrett/Grisham: *Biochemistry*
Transparency 19 Figure 5.9

page 146
©1995 Saunders College Publishing

Estrutura Secundária – Folha β

- Nesta estrutura as pontes de hidrogênio são estabelecidas entre cadeias polipeptídicas diferentes ou entre resíduos de aminoácidos distantes da mesma cadeia.
- Apresentam uma estrutura mais estendida que a α -hélice, o que dá à estrutura formada o aspecto de uma folha pregueada.
- Os grupos R dos aminoácidos projetam-se para cima e para baixo do plano da folha pregueada.
- As Folhas β apresentam 2 variações:
 - A) Folhas β antiparalelas:** em que as cadeias polipeptídicas vizinhas ligadas por pontes de hidrogênio seguem direções opostas
 - B) Folhas β paralelas:** em que as cadeias polipeptídicas vizinhas ligadas por pontes de hidrogênio seguem a mesma direção

Estrutura Secundária – Folha β Antiparalela

Estrutura Secundária – Folha β Paralela

Estrutura Secundária – Folha β

Mioglobina
(80% α -hélice)

Concanavalina
(somente folhas β)

Os tipos principais de estruturas secundárias regulares (α -hélice e folha β) ocorrem em proteínas em proporções variáveis: Ex.:

Mioglobina: proteína do músculo que transporta oxigênio - 80% de α -hélice

Concanavalina: uma proteína vegetal - composta quase totalmente por folhas β

Lisozima: como a grande maioria das proteínas, exhibe os dois tipos de estrutura secundária.

Lisozima
(os dois tipos de estruturas)

Estrutura Terciária

- Resulta de dobras na estrutura da proteína, estabilizadas por interações entre os radicais dos aminoácidos.
- Essas interações são do tipo: **pontes de hidrogênio**, **pontes dissulfeto** (ligação covalente), **interações hidrofóbicas** (entre radicais de aminoácidos apolares), **interações iônicas** (entre radicais de aminoácidos com cargas opostas).

Ligações Iônicas

- Ocorre entre grupos eletricamente carregados, ocorrendo atração eletrostática entre grupos R com cargas opostas
- Ex: Aminoácidos com carga positiva como lisina, arginina e histidina podem estabelecer ligações iônicas com aminoácidos de cargas negativas como aspartato e glutamato.

Ligações Hidrofóbicas

- São estabelecidas entre radicais de aminoácidos apolares. Estes radicais se aproximam e repelem água.
- A maioria das ligações hidrofóbicas localizam-se no interior apolar da molécula protéica, distanciando-se da água.
- As interações hidrofóbicas são as mais importantes para a manutenção da conformação espacial das proteínas, dado o grande número de aminoácidos hidrofóbicos (9).

Pontes de Hidrogênio

- Ocorrem pela atração um átomo de hidrogênio e outro elemento mais eletronegativo geralmente oxigênio ou nitrogênio.
- Ex: serina e treonina, que apresentam grupo OH podem formar pontes de hidrogênio com a asparagina ou glutamina, que apresentam grupo carboxila.

Ligações Covalentes

- Unem átomos formando moléculas duráveis e resistentes.
- Ocorre quando átomos compartilham elétrons.
- Por exemplo: as pontes dissulfeto (-S-S-) que ocorrem entre dois resíduos de cisteína como na insulina, queratinas.

Ponte Dissulfeto
exemplo de ligação
covalente presente na
estrutura terciária

Estrutura Quaternária

-A estrutura quaternária é a associação de 2 ou mais cadeias polipeptídicas, denominadas SUBUNIDADES.

-As subunidades podem ser iguais ou diferentes.

-As forças que estabilizam a estrutura quaternária são as mesmas das estruturas terciárias: ligações iônicas, pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas.

HEMOGLOBINA:
contém 4 subunidades, 2
subunidades α e duas β

NÍVEIS ESTRUTURAIS DAS PROTEÍNAS

Estrutura
Primária

Estrutura
Secundária

Estrutura
Terciária

Estrutura
Quaternária

Conformação nativa - forma ativa da proteína.

addition of urea and mercapto-ethanol

Proteína desnaturada - interações fracas desfeitas.

removal of urea and mercapto-ethanol

Proteína renaturada: a retirada dos agentes desnaturantes faz com que a proteína volte à sua conformação nativa.

Proteínas

- Classificação
 - **De acordo com a conformação**
 - globulares
 - fibrosas
 - **De acordo com os produtos de hidrólise**
 - **Simples:** compostas apenas por aminoácidos
 - **Conjugadas:** além de aminoácidos contém outros grupos químicos na molécula

Proteínas Fibrosas

- São moléculas alongadas, cilíndricas.
- Apresentam baixa solubilidade em água.
- **FUNÇÕES:**
 - ESTRUTURAIS (principalmente): funções protetoras, conectivas ou de sustentação nos tecidos vivos – proteínas da pele, tendões e ossos.
- MOTORA: proteínas musculares
 - colágeno
 - queratina
 - miosina
 - actina

Proteínas Globulares

- Moléculas que apresentam forma aproximadamente esférica
- Relativamente solúveis em água
- Vários papéis funcionais:
 - catalisadores (enzimas)
 - **proteínas de transporte**
 - hormônios

Hemoglobina

Proteínas Conjugadas

Proteínas Conjugadas

- Glicoproteínas – possuem carboidratos como grupos prostéticos
- **Imunoglobulinas ou anticorpos**
 - produzidas pelos linfócitos B
 - efetivas contra infecções bacterianas e em algumas fases das infecções virais
 - 4% de carboidratos
- **Mucinas:**
 - trato gastro-intestinal e aparelho urogenital
 - lubrificantes biológicos protetores
 - podem conter 60% de glicídios
- **Glicoproteínas de membrana**
 - receptores para hormônios, transporte, reconhecimento célula-célula
 - Podem conter 20% de glicídios

Proteínas Conjugadas

- **Lipoproteínas:** o grupo prostético é um lipídio.

- **Metaloproteínas:** grupo prostético contém um metal ligado diretamente ao aminoácido

Proteínas Conjugadas

- Cromoproteínas

Proteínas cujo grupo prostético contém um grupo heme (contém átomo de Ferro) ligado a componentes do grupo prostético.

PRINCIPAIS PROTEÍNAS FIBROSAS

ESTRUTURA DAS α - QUERATINAS

- Existem dois tipos de queratinas: α -queratinas e β -queratinas
- **α -Queratinas**
 - Compostas de α -hélices – são proteínas insolúveis, resistentes e duráveis
 - São ricas no aminoácido cistéina → elevado número de pontes dissulfeto (-S-S-). As pontes dissulfeto conferem resistência às estruturas. Incluem:
 - . Proteínas duras de chifres, cascos, unhas, cabelos – cerca de 22% de cistina
 - . Proteínas flexíveis da pele, calos e lãs – cerca de 10 a 14% de cistina
 - Insolúveis: composição rica em aminoácidos apolares (hidrofóbicos): fenilalanina, valina, metionina e alanina.

ESTRUTURA DAS α - QUERATINAS

Estrutura da Cabelo

Cross section of a hair
(b)

Calor e agentes químicos – rompem as pontes dissulfeto e a α -queratina pode ser esticada; nesta situação as cadeias polipeptídicas assumem a conformação de folha β . Quando o cabelo é lavado e resfriado as cadeias polipeptídicas revertem a sua conformação em α -hélice.

PONTES DISSULFETO ENTRE RESÍDUOS DE CISTEÍNA DAS α QUERATINAS

ESTRUTURA DAS β - QUERATINAS

- Empilhamento de Folhas β pregueadas.
- Ricas em glicina (cerca de 30%), alanina e serina, formada por uma seqüência periódica de 6 resíduos:

(glicina-serina-glicina-alanina-glicina-alanina) $_n$

- Não contém cisteína: sem pontes dissulfeto.
- Compõem a estrutura da fibroína da seda e teias de aranha, penas
- são flexíveis mas não distendem
- a estrutura folha pregueada só pode existir com aminoácidos com grupos R pequenos como a glicina, serina e alanina.

ESTRUTURA DAS β - QUERATINAS

Figure 7-29. Silk fibroin.

70 μm

(b)

ESTRUTURA DO COLÁGENO

- É a proteína mais abundante do vertebrados. Encontrado no couro, tecido conjuntivo, tendões, cartilagens e ossos.
- Suas fibras são responsáveis pelas funções mecânicas e de sustentação do tecido conjuntivo.
- Mantém a forma dos órgãos: vasos sanguíneos, fígado, pulmões e outros
- É composto principalmente por **glicina, prolina e hidroxiprolina (ou hidroxilisina)**.

X-Pro-Hyp-Gly-X-Pro-Hyp-Gly

Onde X pode ser qualquer um dos 20 aminoácidos-padrão.

- **Estrutura:**
 - 3 cadeias polipeptídicas paralelas enrolam-se uma em torno da outra em forma de corda, formando uma HÉLICE TRIPLA: **o tropocolágeno**
 - ocorrem pontes de hidrogênio entre a glicina e a prolina de hélices adjacentes, estabilizando a tripla hélice.
 - também ocorrem ligações covalentes cruzadas entre as moléculas de tropocolágeno, principalmente entre resíduos de lisina e histina, que conferem resistência e insolubilidade ao colágeno.
- A fervura em água transforma o colágeno (fibroso e insolúvel) em gelatina, uma mistura de polipeptídeos solúveis.

ESTRUTURA DO COLÁGENO

ESTRUTURA DO COLÁGENO

PROTEÍNAS GLOBULARES

PROTEÍNAS GLOBULARES

Mioglobina/Hemoglobina

- Mioglobina - primeira proteína com estrutura determinada.
- Transportadoras de oxigênio.
 - Hemoglobina: transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos.
 - Mioglobina: função de armazenar O_2 e torná-lo disponível para os músculos.

HEMOGLOBINA

- **ESTRUTURA DA HEMOGLOBINA:**
 - Proteína globular
 - Estrutura quaternária: 4 subunidades - 2 α (α_1 e α_2) e 2 β (β_1 e β_2)
 - Contém 4 grupos **heme** - grupos prostéticos
 - Função: transporte de O_2 dos pulmões para os tecidos

Células
vermelhas do
sangue
(eritrócitos)

MIOGLOBINA

- **ESTRUTURA DA MIOGLOBINA:**
 - Proteína globular
 - Estrutura terciária: 1 cadeia polipeptídica
 - Contém um grupo **heme** - grupo prostético
 - Função: transporte e armazenamento de O_2 dentro do tecido muscular. Importante em mamíferos aquáticos (10x mais mioglobina do que nos mamíferos terrestres).

Oxigênio ligado à hemoglobina apresenta cooperatividade positiva

- Hemoglobina liga-se a 4 moléculas de O_2 .
- A hemoglobina totalmente oxigenada contém 4 moléculas de O_2 - é a OXI-HEMOGLOBINA ou oxi-Hb ou HbO_2
- A hemoglobina desprovida de O_2 é a DESOXI-HEMOGLOBINA ou desoxi-Hb ou Hb.
- Uma molécula de O_2 ligada aumenta a afinidade pelas outras moléculas de O_2 .
- A afinidade aumenta devido à mudanças na conformação da hemoglobina.
- Forma Desoxigenada = forma T (tensa) = baixa afinidade.
- Forma Oxigenada = forma R (relaxada) = alta afinidade

Oxigênio ligado à Hemoglobina apresenta cooperatividade positiva

Key:

- Hb subunits, weak-binding state
- Hb subunits, strong-binding state
- Hb tetramer, T state
- Hb tetramer, R state
- Oxygen
- No oxygen bound
- Oxygen bound

Curvas de Ligação do Oxigênio

- Mioglobina tem uma curva de saturação pelo oxigênio hiperbólica

Mioglobina liga-se fortemente ao oxigênio. Libera o oxigênio em pO_2 (pressão de oxigênio) muito baixas - menores que 20 mmHg.

- Hemoglobina tem uma curva de saturação pelo oxigênio sigmoidal, indicando a cooperatividade positiva.

- Hemoglobina tem alta afinidade pelo oxigênio em altas pO_2 (pulmões) - 100mmHg.

- Hemoglobina tem baixa afinidade pelo oxigênio em baixas pO_2 (tecidos) - aproximadamente 20mmHg.

EFEITO BOHR

- A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio varia com o pH: é menor em pHs mais baixos (ácidos).
- Quando a pO_2 diminui e a concentração de H^+ aumenta, a hemoglobina libera o oxigênio e capta o H^+ - situação encontrada nos TECIDOS. O H^+ não se liga ao Fe(II) mas em outros aminoácidos da cadeia da hemoglobina.
- Quando a pO_2 aumenta e a concentração de H^+ diminui, a hemoglobina libera o H^+ e capta o oxigênio - situação encontrada nos PULMÕES.

- Nos tecidos o CO_2 produzido pelo metabolismo difunde-se para as hemáceas, onde é hidratado numa reação catalisada pela enzima anidrase carbônica, formando H_2CO_3 (ácido carbônico)
- No sangue (pH 7,4-7,2), o H_2CO_3 dissocia-se em HCO_3^- e H^+ .

No sangue

- Ou seja, um aumento na concentração de CO_2 causa diminuição do pH.
- Esse aumento da acidez, associado à baixa $p\text{O}_2$ nos tecidos, faz com que a hemoglobina libere o O_2 e capte o H^+ .
- O HCO_3^- , produzido nas hemáceas, difunde-se pelo plasma e vai até os pulmões.
- Nos pulmões a situação se inverte: a alta $p\text{O}_2$ leva à oxigenação da hemoglobina e liberação do H^+ .
- Com a baixa $p\text{CO}_2$ alveolar, ocorre a formação de água e CO_2 , que é eliminado na atmosfera.

Nos pulmões

Eliminado
para a
atmosfera

Efeito do Monóxido de Carbono – Carboxiemoglobina

- O monóxido de carbono (CO) tem afinidade cerca de 25.000 vezes maior pela hemoglobina do que o oxigênio.
 - Quando o CO se liga a um ou mais grupos heme da hemoglobina, esta tem sua conformação modificada de modo que os grupos heme restantes se ligam mais fortemente ao oxigênio.
 - Desta forma, a hemoglobina afetada torna-se incapaz de liberar o oxigênio para os tecidos.
- 20 - 30% da Hb ligada ao CO: primeiros sinais de hipóxia (tontura, confusão mental)
 - Acima de 60% da Hb ligada ao CO: perda de consciência e morte por asfixia
- Terapia: tratamento com aplicação de atmosfera com 100% de oxigênio, o que facilita a dissociação do monóxido de carbono da hemoglobina

LEGHEMOGLONIA

Figura 2. Nódulos de soja em corte. Zona central fixadora vermelha devido ao pigmento da Leghemoglobina.
Foto: Gregorio Trujillo.

Algumas leguminosas quando infectadas por bactérias fixadoras de N_2 , desenvolvem nódulos, dentro dos quais esses bacterióides fixam-se.

Tanto as bactérias como as células vegetais necessitam de oxigênio, assim, a planta desenvolve uma estrutura similar à mioglobina animal: a LEGHEMOGLOBINA

A leghemiglobina é composta de um única subunidade, contendo um grupo heme.

O átomo de Fe do grupo heme confere aos nódulos uma coloração vermelha, assim como a mioglobina e a hemoglobina conferem coloração vermelha aos músculos e sangue arterial, respectivamente.

Função: Transporte de O_2 para os bacterióides e células vegetais localizadas dentro dos nódulos de algumas leguminosas.

HEMOGLOBINAS ANORMAIS

- **HEMOGLOBINOPATIAS:** hemoglobinas anormais, geralmente resultantes da substituição de um único aminoácido.
- **ANEMIA FACIFORME:** o aminoácido **ácido glutâmico** é substituído por outro, a **valina**. Essa única substituição causa o afoiçamento das hemáceas - Hemoglonina S
 - Hemoglobina S: vive metade do tempo em relação a uma hemácea normal.
 - O paciente apresenta dor, anemia e icterícia, a esclerótica (branco dos olhos) torna-se amarelada e ocorre palidez cutânea. Essa cor amarelada ocorre devido à destruição precoce das hemácias, resultando em palidez devido à anemia.

ANEMIAS

- Existem vários tipos de anemia e várias causas para essa doença. As mais comuns são:
- **ANEMIA CAUSADA POR CARÊNCIA NUTRICIONAL:**
 - Anemia Ferropênica: causada pela carência de ferro na alimentação
 - Anemia por carência de vitamina B12 e ácido fólico (vitamina do complexo B): essas vitaminas são importantes na produção dos glóbulos vermelhos. Sua carência resulta na diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue.
 - Vitamina B12: encontrada em alimentos de origem animal
 - Ácido fólico: encontrado em folhas verde-escuras.
- **ANEMIA CAUSADA POR PERDA CRÔNICA DE SANGUE:**
 - Verminoses (como a ancilostomíase ou "amarelão") que provocam perda intestinal constante de sangue.
 - Hipermenorréia: perda excessiva de sangue pela menstruação