

# Dépistage du cancer du col de l'utérus

## 1 Qui est concerné ?

Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans

## 2 Que dépiste-t-on et par quel moyen ?

### a L'infection par un papillomavirus

- Le papillomavirus (HPV) est responsable du cancer du col de l'utérus
- C'est une infection sexuellement transmissible très fréquente et qui ne provoque pas de symptôme
- Elle guérit spontanément dans la plupart des cas
- Dans quelques cas, le virus peut persister dans les cellules et après plusieurs années provoquer un cancer



→ Par un test HPV 

Cet examen de laboratoire recherche l'ADN des papillomavirus responsable du cancer

### b Le cancer du col de l'utérus & les lésions précancéreuses du col de l'utérus

- En France 3 100 cancers du col de l'utérus et 30 000 lésions précancéreuses sont diagnostiqués chaque année
- Les lésions précancéreuses correspondent au stade précédent le cancer

→ Par un examen cytologique du frottis   
Cet examen recherche les cellules cancéreuses et précancéreuses

Test HPV  et examen du frottis  sont réalisés sur un même prélèvement cervico-vaginal

## 3 En pratique ?

### a Entre 25 ans et 30 ans

Le dépistage repose sur un 1er frottis  répété 1 an plus tard, puis après 3 ans



### b Entre 30 ans et 65 ans

Le dépistage repose sur un test HPV  répété tous les 5 ans s'il est négatif

