



Qui ?

• Dépistage « systématique »

Population	IST	Contexte
Recommandations générales	<i>Chlamydia trachomatis</i> / gonocoque	- Femme de 15 à 25 ans : au moins 1 dépistage y compris la femme enceinte ¹ - Homme sexuellement actif présentant des facteurs de risque ¹ - Femmes sexuellement actives de plus de 25 ans présentant des facteurs de risque ¹ - Femmes enceintes consultant pour une IVG sans limite d'âge → En cas de test négatif et de rapports sexuels non protégés avec un nouveau partenaire, le dépistage est répété chaque année. Si le test est positif : traitement et nouveau dépistage à 3-6 mois ¹
	VIH	- Au moins 1 fois dans la vie entre 15 ans et 70 ans ² - Tous les ans chez les personnes originaires de zones de forte prévalence de l'infection à VIH (Afrique Subsaharienne, Caraïbes...) ² - Diagnostic de tuberculose ² - Démarche volontaire ²
	Syphilis	- En cas de pratiques à risque ³ - Migrants en provenance de pays d'endémie (Afrique, Asie, Europe de l'Est, Amérique du Sud) ³
	Hépatite B	- Avant vaccination anti-VHB ⁴ - En cas de facteurs de risque de transmission du VHB (rapports sexuel non protégés...) ⁴ - Entourage ou partenaire(s) connu(s) porteur(s) chronique(s) de l'antigène Hbs ⁴ - Patients dialysés ⁴ - Personnes originaires de zone d'endémie (Afrique sub-saharienne, Afrique du Nord, Europe orientale, Extrême-Orient et Amérique du Sud) ⁴
	Hépatite C	- Les personnes transfusées avant 1992 ⁵ - Les partenaires sexuels et les membres de l'entourage familial des personnes atteintes d'hépatite chronique C ⁵ - Les personnes originaires ou ayant reçu des soins dans des pays à forte prévalence de l'hépatite C ⁵ - Patients dialysés (par analogie avec l'hépatite B)
HSH*	<i>C. trachomatis</i> / gonocoque	En cas de rapport non protégés : tous les 3 à 6 mois ¹
	Syphilis	En cas de rapport non protégés : tous les ans ou plus fréquent selon les comportements à risque ³
	VIH	En cas de rapport non protégés : tous les 3 mois ²
	Hépatite B	Tous les 6 à 12 mois
	Hépatite C	Tous les 6 à 12 mois

* Homme ayant des relations sexuelles avec les hommes



Population	IST	Contexte
Femmes enceintes	<i>C. trachomatis</i> / gonocoque	Au moins 1 dépistage entre 15 et 25 ans ¹
	Syphilis	- Au premier trimestre ³ - A renouveler au 3^{ème} trimestre en zone à risque de syphilis congénitale (Réunion, Mayotte, Guyane française...)
	VIH	- Obligatoire au premier trimestre ⁶ - Recommandé à la première consultation prénatale ⁶ - A renouveler à 6 mois selon les conduites à risque +++
	Hépatite B	- Dépistage de l'antigène Hbs obligatoire au 6^e mois de grossesse ⁷ - Recommandé à la première consultation prénatale ⁷
	Hépatite C	Recommandé à la première consultation prénatale ⁴
Usagers de drogues injectables	<i>C. trachomatis</i> / gonocoque	Non recommandé
	Syphilis	Non recommandé
	VIH	Tous les ans ⁶
	Hépatite B	Fréquence non définie.⁴ A minima tous les ans par analogie à la fréquence du dépistage du VIH
	Hépatite C	Fréquence non définie.⁵ A minima tous les ans par analogie à la fréquence du dépistage du VIH
Travailleurs du sexe	<i>C. trachomatis</i> / gonocoque	Tous les 3 à 6 mois
	Syphilis	Tous les 3 à 6 mois
	VIH	Tous les 3 à 6 mois
	Hépatite B	Tous les 3 à 6 mois
	Hépatite C	Tous les 3 à 6 mois

• Dépistage opportuniste

Contexte	IST dépistées
En cas de rapport sexuel non protégés	Toutes les IST
Lors rapport sexuel non consenti	Toutes les IST
Lors du diagnostic d'une autre IST	Toutes les IST
Femmes enceintes consultant pour une IVG	Toutes les IST
Lors d'une incarcération	VIH, hépatite B, hépatite C et syphilis



Où ?

CeGIDD*

- Anonyme et gratuit : toutes les IST

Laboratoires de biologie médicale

- Pris en charge et sans ordonnance quel que soit l'âge pour le VIH
- Pris en charge et sans ordonnance jusqu'à 26 ans pour chlamydia/gonocoque, hépatite B, syphilis (possible sans ordonnance au-delà de 26 ans avec part mutuelle à charge en l'absence de mutuelle)
- Sur ordonnance : toutes les IST


Associations

- Anonyme et gratuit : VIH, hépatite B, hépatite C

* Centre Gratuit d'Informations, de dépistage et de diagnostic


Comment ?

Chlamydia trachomatis / gonocoque



TAAN = Test d'amplification des acides nucléiques

VIH, hépatites virales, syphilis





Références

1. Haute Autorité de Santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage des infections à *Chlamydia trachomatis*. 2018.
2. Haute Autorité de Santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage de l' infection à VIH en France Argumentaire scientifique. 2017.
3. Haute Autorité de Santé. Évaluation a priori du dépistage de la syphilis en France. Mai 2007. Synthèses et perspectives. 2007.
4. Haute Autorité de Santé. Recommandations de prise en charge des personnes infectées chroniquement par le virus de l'hépatite B. 2023.
5. Haute Autorité de Santé. Place des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) dans la stratégie de dépistage de l' hépatite C. 2014.
6. Haute Autorité de Santé. Réévaluation de la stratégie de dépistage de l'infection à VIH en France. 2017.
7. Haute Autorité de Santé. Dépistage prénatal de l'hépatite B. 2009.