

Vaccination au cours de la grossesse



Enjeux

Vous protéger

- Les infections peuvent être plus graves pendant la grossesse,
- Elles peuvent avoir des conséquences sérieuses : la fièvre, par exemple, peut déclencher des contractions utérines. Si elles ne sont pas traitées, cela peut entraîner une fausse couche ou un accouchement prématuré, selon le stade de la grossesse.
- Le virus de la rubéole peut provoquer des malformations

Protéger votre nouveau-né

- Lorsque vous êtes vaccinée pendant la grossesse, votre corps produit des anticorps contre le virus ou la bactérie ciblé(e) par le vaccin. Ces anticorps vous protègent et sont transmis à votre bébé pendant la grossesse.
- À la naissance, votre enfant va être protégé par les anticorps que vous lui avez transmis pendant environ 3 à 6 mois.

? Qui

La vaccination concerne toutes les femmes enceintes. Les vaccins recommandés sont sûrs.



Quels vaccins et quand ?

Avant la grossesse

Je vérifie que mes vaccinations sont à jour :

- Coqueluche
- ROR
- Varicelle (si jamais contractée)

Je me fais vacciner si nécessaire

Pendant la grossesse

Je me fait vacciner contre :

Le VRS

Pour les femmes enceintes de 32 à 36 semaines entre septembre et janvier et au moins 2 semaines avant l'accouchement. L'administration d'anticorps à la naissance de votre nourrisson est une alternative possible. Cette option est privilégiée en cas de nouvelle grossesse si vous avez déjà été vacciné.

La Coqueluche

A chaque grossesse, à partir du 2^e trimestre. Idéalement entre 20 et 36 semaines et au moins 4 semaines avant l'accouchement

La COVID-19

A chaque grossesse et à tout moment de la grossesse. Au moins 6 mois après la dernière dose de vaccin ou la dernière infection

La grippe

A chaque grossesse pendant la campagne de vaccination contre la grippe (mi-octobre à janvier)
À tout moment de la grossesse