

# Vaccination des professionnels en milieu hospitalier

## 7 Vaccins

### Obligatoires

- DTP\*
- Hépatite B

### Recommandés

- ROR\*
- Varicelle
- Grippe
- COVID-19
- Coqueluche

\*DTPCa : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche ; ROR : rougeole, oreillons, rubéole

## Principales maladies prévenues

	Principales atteintes d'organes					Mode de transmission		
					Autre			Autre
Diphtérie	✓	✓	✓			✓		
Tétanos	✓							✓
Poliomyélite	✓							✓
Coqueluche		✓				✓		
Hépatite B				✓			✓	
Rougeole	✓	✓			✓	✓		
Oreillon	✓					✓		
Rubéole					✓	✓		
Grippe		✓				✓		
COVID-19		✓				✓		
Varicelle	✓				✓	✓		✓

## Calendrier vaccinal

	Primo-vaccination si non vacciné	Rappels / Re-vaccination		
		25 ans	45 ans	65 ans
DTP Coqueluche	2 doses et 1 rappel	✓	✓	✓
ROR <sup>a</sup>	Né avant 1980 : 1 dose <sup>b</sup> Né après 1980 : 2 doses	Pas de rappel		
Hépatite B	3 doses <sup>c</sup>	Pas de rappel		
Varicelle	Si sérologie négative : 2 doses	Pas de rappel		
Grippe	Non applicable	Vaccination chaque année		
COVID-19	Non applicable	Vaccination chaque année		


<sup>a</sup> S'assurer de l'absence de grossesse. <sup>b</sup> Sans antécédent de rougeole. <sup>c</sup> Le dosage des anticorps anti-HBs est préconisé 4 à 8 semaines après la dernière dose de vaccin. En cas de non réponse au vaccin l'administration de doses complémentaires est possible (jusqu'à 6 doses au total au maximum)

## Recommandations particulières



Si exposition à risque et sur avis du médecin du travail

- **Laboratoires** : hépatite A, BCG, rage, fièvre jaune et méningocoque
- **Laboratoires en Guyane** : fièvre jaune
- **Prise en charge des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la propreté** : hépatite A
- **Exposition à la tuberculose**, non vaccinés et test immunologique de référence négatif : BCG



+ 65 ans

- **Zona**
- **Pneumocoque** 20 valences
- **VRS** : en cas de pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques, et pour toutes les personnes à partir de 75 ans