

du 23 au 27 septembre 2024

- Chaque colle commencera systématiquement par une question de cours.
- $\blacklozenge$  désigne une proposition, un théorème ou un résultat dont l'énoncé doit être parfaitement connu, mais dont la démonstration est hors-programme ou n'est pas exigible.
- $\blacktriangleright$  désigne une proposition, un théorème ou un résultat dont l'énoncé à connaître et dont la démonstration est à connaître également.
- Il faut savoir qu'aux concours, les candidats sont fréquemment interrogés sur des questions de cours. Les points du cours retenus sont : 1) ceux qui tombent fréquemment aux concours, 2) ceux qui sont particulièrement importants, 3) ceux dont la démonstration met en jeu des raisonnements qui peuvent être utiles en exercice.

## Chapitre 1 : Rappels et compléments sur les suites réelles et complexes

### I : Généralités

- 1) **Définition** : définition d'une suite, d'une suite bornée, d'une suite convergente.
- 2) Une suite convergente est toujours bornée.
- 3) **Théorèmes généraux de convergence** : somme, produit de suites convergentes, combinaison linéaire, inverse, composition par une fonction continue.
- 4) **Proposition** : convergence d'une suite complexe

### II : Suites extraites

- 1) définition d'une suite extraite ou sous-suite.  
**Proposition** : une sous-sous suite est une sous-suite.
- 2)  $\blacktriangleright$  **Théorème** : si un converge alors ses sous-suites aussi.
- 3) Définition d'une valeur d'adhérence.
- 4) **Remarque** : Par contraposée, si une suite admet deux valeurs d'adhérence distinctes alors elle diverge.
- 5) **Théorème** : si  $u_{2n}$  et  $u_{2n+1}$  convergent vers la même limite  $\ell$  alors  $u_n$  aussi.

### III : Suites réelles

- 1) suite majorée, minorée, suite divergente en  $\pm\infty$ , Théorème des



- 2) **Théorème** : tout réel est limite d'une suite de rationnels.
- 3) **►** :  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .
- 4) **Parties denses dans  $\mathbb{R}$** .
- 5) Approximation à  $10^{-n}$  près par défaut et par excès d'un réel.
- 6) **Théorème de Bolzano-Weierstrass (HP)** : toute suite bornée admet une sous-suite convergente.
- 7) Une suite bornée qui n'admet qu'une valeur d'adhérence est convergente.
- 8) Définition et propriétés des suites adjacentes.

#### IV : relations de comparaisons

- 1) **Définition** : Equivalents, relation de domination
- 2) **◆ Suites de références** :

**Théorème** :  $(\ln n)^\beta \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$  où  $\ll$  signifie "négligeable devant" et où  $\alpha$  et  $\beta$  sont des réels positifs et  $a > 1$ .

- 3) exemples.

#### V : Cesàro

- 1) **Théorème de Cesàro** : si  $u_n \rightarrow \ell$  alors  $v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \rightarrow \ell$ .
- 2) **► Cesàro généralisé** : soit  $a_n$  le terme général d'une série à termes positifs divergente, et soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite qui converge vers  $\ell$ , alors  $v_n = \frac{\sum_{k=0}^n a_k u_k}{\sum_{k=0}^n a_k} \rightarrow \ell$ .
- 3) **lemme de l'escalier** : soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite telle que  $u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell$  alors  $u_n \sim n\ell$ .

#### VI : Autres méthodes de convergence

- Sommes de Riemann (qui seront revues dans le chapitre sur l'intégration), Suites définies implicitement.

#### VII : Suites récurrentes

- 1) Cas général, cas où  $f$  croissante, décroissante, **►** contractante.
- 2) **►** équivalent d'une suite définie par récurrence :  $u_{n+1} = f(u_n)$  qui tend vers 0 avec  $f(x) = x - ax^p + o(x^p)$ .
- 3) Suites homographiques :  $u_{n+1} = \frac{au_n + b}{cu_n + d}$

## Chapitre 2 : Séries Numériques

### I : Généralités

- 1) Définitions d'une série, convergence ou divergence d'une série  $\sum u_n$ .
- 2) Somme partielle  $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ , reste d'ordre  $n$  d'une série convergente :  $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k$ .
- 3) **Condition Nécessaire de convergence** :  $\boxed{\sum u_n \text{ converge} \implies u_n \rightarrow 0}$  mais la réciproque est fautive.
- 4) Lien suite/séries : si  $u_n = a_{n+1} - a_n$  alors  $\sum u_k$  convergente  $\iff$  la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
- 5) Opérations sur les séries : si  $\sum u_n$  et  $\sum v_n$  sont convergentes alors  $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$  aussi et  $\sum_{\mathbb{N}} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{\mathbb{N}} u_n + \mu \sum_{\mathbb{N}} v_n$ .

### II : Séries à termes positifs : toutes les suites considérées dans cette partie sont à termes positifs.

- 1)  $\sum u_k$  converge  $\iff$  les sommes partielles  $S_n$  sont majorées.
- 2) **Théorèmes de comparaison, d'équivalents de séries à termes positifs.**

- 3) **► Séries de Riemann** :  $\boxed{\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ CV} \iff \alpha > 1}$ .

- 4) **► Théorème** :

- a) si  $\exists \alpha > 1$  et  $A \in \mathbb{R}_+$  tel que  $u_n \sim \frac{A}{n^\alpha}$  ou  $u_n = o(\frac{1}{n^\alpha})$  ou  $u_n = \mathcal{O}(\frac{1}{n^\alpha})$  alors  $\sum u_k$  CV.
- b) si  $\exists \alpha \leq 1$  et  $A \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $u_n \sim \frac{A}{n^\alpha}$  ou  $\frac{1}{n^\alpha} = o(u_n)$  ou  $\frac{1}{n^\alpha} = \mathcal{O}(u_n)$  alors  $\sum u_k$  DV.

- 5) **Proposition** :

- a) **►** si  $\alpha > 1$ ,  $R_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha - 1}$
- b) **►** si  $\alpha < 1$ ,  $S_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1 - \alpha}$

- 6) **► Règle de Jean le Rond d'Alembert** :

- a) si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$  avec  $0 \leq k < 1$  à partir d'un certain rang, alors  $\sum u_k$  CV. (c'est le cas si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell < 1$ ).
- b) si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$  à partir d'un certain rang alors  $\sum u_k$  DV. (c'est le cas si  $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell > 1$ ).

- 7) **Séries de Joseph Bertrand (HP)** :  $\boxed{\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \text{ CV} \iff (\alpha > 1) \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)}$ .

- 8) **► Proposition : sommation des relations de comparaison** :

si  $u_n \sim v_n$  et

- a) si  $\sum u_n$  CV alors  $\sum_{n+1}^{\infty} u_k \sim \sum_{n+1}^{\infty} v_k$

- b) si  $\sum u_n$  DV alors  $\sum_0^n u_k \sim \sum_0^n v_k$

de même, si  $u_n = o(v_n)$  (resp.  $O(v_n)$ ) et

a) si  $\sum v_n$  CV alors  $\sum_{n+1}^{\infty} u_k = o\left(\sum_{n+1}^{\infty} v_k\right)$  (resp.  $O(\dots)$ )

b) si  $\sum u_n$  DV alors  $\sum_0^n u_k = o\left(\sum_0^n v_k\right)$  (resp.  $O(\dots)$ )

### III : Séries à termes quelconques :

1) **Définition** : séries absolument convergentes.

2) **Proposition** : une série ACV est CV.

3) **Définition** :  $\exp(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$ .

4) **Définition** : séries semi-convergentes, séries alternées.

5) **►** : **Critère spécial des séries alternées** :

Soit  $u_n = (-1)^n a_n$  tel que la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  soit décroissante, positive et tendant vers 0 alors

a)  $\sum u_n$  CV ,

b)  $R_n$  est du signe de  $(-1)^{n+1}$  ,

c)  $|R_n| \leq a_{n+1}$  .

Remarque : ce résultat reste valable, même si la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ne décroît qu'à partir d'un certain rang  $N$  (dans ce cas, (ii) et (iii) ne valent qu'à partir du rang  $N$ ).

6) **Méthode d'éclatement des termes.**

7) **◆** **Produit de Louis-Augustin Cauchy** :

soient deux suites  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . On pose  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ .

**Proposition** : Si  $\sum a_n$  et  $\sum b_n$  sont ACV alors  $\sum c_n$  est ACV et  $\sum c_n = (\sum a_n)(\sum b_n)$ .


#### IV : Comparaison série-intégrale :

Soit  $f$  une fonction positive, continue par morceaux, décroissante sur  $\mathbb{R}^+$ .  
alors pour tout  $k \geq 1$ ,

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k)$$

d'où l'on déduit

$$\int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt$$



**Remarque :** si  $f$  est croissante, les inégalités sont inversées.

#### V : Compléments de cours

##### 1) Règle de Jean-Marie Constant Duhamel :

Soit  $u_n > 0$  tel que  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$  alors il existe une constante  $A$  telle que  $u_n \sim \frac{A}{n^\alpha}$ .

##### 2) Transformation d'Abel : Soient $(u_n)$ et $(v_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ . On pose $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$ .

(i)  $\sum_{k=0}^n u_k v_k = u_n V_n + \sum_{k=0}^{n-1} (u_k - u_{k+1}) V_k$ .

(ii) On en déduit que si la suite  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée et si la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est positive, décroissante et tend vers 0 alors  $\sum u_n v_n$  converge.

**Application :** convergence de  $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n^\alpha}$ ,  $\sum \frac{\sin(n\theta)}{n^\alpha}$ ,  $\sum \frac{\exp(in\theta)}{n^\alpha}$ .

##### 3) Remarque : Modifier l'ordre des termes d'une série semi-convergente peut modifier sa somme ou même sa nature.

---

Prochain programme : Structures algébriques. Espaces vectoriels.