

dobrze.

nicienie do zwalczania larw opuchlaków i pędraków

nemamax® (*Heterorhabditis downesi*)

DYSTRYBUTOR:
BIOCONT Polska sp. z o.o.
Ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków
tel: +48 795 999 178
www.biocont.pl

PRODUCENT:
e-nema
Klausdorfer Str. 28 - 36,
24223 Schwententhal, Niemcy
www.e-nema.de

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Najlepiej zastosować nicienie jak najszybciej po dostarczeniu.

Jeśli to konieczne, produkt można przechowywać w temperaturze 4-8°C (w lodówce) do daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 35°C.

Termin zastosowania:

Nicienie można stosować przez cały sezon wegetacyjny kiedy temperatura podłoża przekracza 8°C. Ważne aby nicienie były stosowane w czasie występowania larw zwalczanych szkodników.

Warunki stosowania:



Nie stosować w pełnym słońcu.

min 12°C



Nicienie są efektywne w temperaturze gleby/podłoża od 8°C. W niższych temperaturach skuteczność nicieni spada.

W ciągu 30 min od aplikacji należy podlać miejsca gdzie były aplikowane nicienie. To konieczne aby nicienie dobrze rozprowadziły się w profilu glebowym.

Powierzchnia gleby podczas aplikacji powinna być wilgotna i powinna pozostać wilgotna przez dwa tygodnie. Co oznacza, że po aplikacji należy regularnie podlewać rośliny aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża. Nicienie giną w suchych warunkach.


Wskazówki dla efektywnego zwalczania opuchlaków i pędraków:

Nicienie skutecznie zwalczają larwy i poczwarki opuchlaków oraz larwy pędraków, przy czym najsilniej atakują ich młode stadia rozwojowe (szczególnie w przypadku pędraków). Gatunek *Heterorhabditis downesi* wyróżnia się wysoką tolerancją na chłód, co pozwala na jego stosowanie już od lutego do października. Kluczowym warunkiem skuteczności jest temperatura gleby – musi ona wynosić co najmniej 8°C przez kilka godzin ciągu doby, aby nicienie mogły aktywnie poszukiwać swoich żywicieli.

dobrze.

nicienie do zwalczania larw opuchlaków i pędraków

nemamax[®] (*Heterorhabditis downesi*)



INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZABIEGU I APLIKACJI

1. Otwórz saszetkę z nicieniami i wsyp całą zawartość do czystego pojemnika (np. słoika, kubeczka lub miski).
2. Dodaj niewielką ilość wody (wystarczająco dużo, aby zawartość łatwo się mieszała i nie tworzyła grudek). Następnie delikatnie wymieszaj, aż uzyskasz zawiesinę bez większych grudek.
3. Wlej gotową zawiesinę bezpośrednio do konewki i dolej resztę wody, aż uzyskasz pożądaną objętość (zgodnie z zaleceniami z etykiety).
4. Podlewaj rośliny tak, aby pokryć powierzchnię gleby. Mieszaj lub potrząsaj konewką co jakiś czas w trakcie podlewania. Dzięki temu nicienie nie osiadą na dnie i będą równomiernie aplikowane. W ciągu pół godziny od aplikacji należy podlać rośliny aby nicienie mogły się rozprzestrzeniać.

WSKAZÓWKI!

Wsypanie saszetki prosto do pełnej konewki utrudnia wymieszanie, przez co nicienie mogą osiąść na dnie i nie zostaną równomiernie rozniesione lub zlepić się w grudki zatykające otwory konewki.

Pamiętaj, aby podłoże było wilgotne przed i po aplikacji. Nicienie najlepiej działają w wilgotnej glebie!

DAWKOWANIE

Liczba nicieni w opakowaniu	Rozpuść w	Wystarczy na powierzchnię
2,5 miliona	5 litrach wody	5 m ²
5 milionów	10 litrach wody	10 m ²
10 milionów	20 litrach wody	20 m ²
25 milionów	50 litrach wody	50 m ²

Nicienie można rozpuścić w mniejszej objętości wody jeśli ma to ułatwić aplikację. Należy jednak pamiętać o obfitym podlaniu podłoża w miejscach gdzie były aplikowane nicienie do pół godziny po aplikacji!