

dobrze. niciansie do zwalczania larw ziemioerek

nemaplus® (*Steinernema feltiae*)

DYSTRYBUTOR:
BIOCONT Polska sp. z o.o.
Ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków
tel: +48 795 999 178
www.biocont.pl

PRODUCENT:
e-nema
Klausdorfer Str. 28 - 36, 24223 Schwentental, Niemcy
www.e-nema.de

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Najlepiej zastosować niciansie jak najszybciej po dostarczeniu.

Jeśli to konieczne, produkt można przechowywać w temperaturze 4-8°C (w lodówce) do daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 30°C.

Termin zastosowania:

Niciansie można stosować przez cały rok. Ważne aby były one zastosowane w czasie występowania larw zwalczanych szkodników.

Warunki stosowania:



Nie stosować w pełnym słońcu.

min 8°C
max 28°C



Niciansie są efektywne w temperaturze gleby/podłoża od 8 do 28°C. W wyższych temperaturach skuteczność niciansia spada.

Powierzchnia gleby podczas aplikacji powinna być wilgotna i powinna pozostać wilgotna przez dwa tygodnie. Co oznacza, że po aplikacji należy regularnie podlewać rośliny aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża. Niciansie giną w suchych warunkach.

Wskazówki dla efektywnego zwalczania ziemioerek:

Bezpośrednio po zastosowaniu niciansie pozostają w górnej warstwie podłoża w doniczce (około 4 cm głębokości) i od razu zaczynają działać. Znajdują się tam również najmłodsze larwy ziemioerek oraz jaja, z których wylęgają się kolejne larwy.

W ciągu tygodnia niciansie rozprzestrzenią się po całej doniczce.

10 dni po zastosowaniu preparatu nemaplus® liczba larw ziemioerek zmniejsza się zazwyczaj o 75%. Drugie zastosowanie po 3 tygodniach zwiększa skuteczność. Rozmnażanie się niciansia w larwach ziemioerek zapewnia długotrwały efekt, o ile nie dopuścisz do przesuszenia podłoża.


Możesz użyć więcej wody, niż podano w instrukcji.

Najważniejsze jest, aby cała zalecana dawka niciansia trafiła do podłoża. Jeśli podlewasz obficie, po prostu dodaj więcej wody. Liczy się liczba niciansia na danym obszarze, a nie stężenie roztworu.

dobrze.

nicienie do zwalczania larw ziemiórek

nemaplus[®] (*Steinernema feltiae*)



INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZABIEGU I APLIKACJI

1. Otwórz saszetkę z nicieniami i wsyp całą zawartość do czystego pojemnika (np. słoika, kubeczka lub miski).
2. Dodaj niewielką ilość wody (wystarczająco dużo, aby zawartość łatwo się mieszała i nie tworzyła grudek). Następnie delikatnie wymieszaj, aż uzyskasz zawiesinę bez większych grudek.
3. Wlej gotową zawiesinę bezpośrednio do konewki i dolej resztę wody, aż uzyskasz pożądaną objętość (zgodnie z zaleceniami z etykiety).
4. Podlewaj rośliny tak, aby pokryć całą powierzchnię doniczki. Mieszaj lub potrząsaj konewką co jakiś czas w trakcie podlewania. Dzięki temu nicienie nie osiadną na dnie i będą równomiernie aplikowane.

WSKAZÓWKI!

Wsypanie saszetki prosto do pełnej konewki utrudnia wymieszanie, przez co nicienie mogą osiąść na dnie i nie zostaną równomiernie rozniesione lub zlepić się w grudki zatykające otwory konewki.

Pamiętaj, aby podłoże było wilgotne przed i po aplikacji. Nicienie najlepiej działają w wilgotnej glebie!

DAWKOWANIE

1 litr roztworu z nicieniami na 1 m² gleby.

W przypadku doniczek, 0,1l (100 ml) roztworu z nicieniami na 1 litr ziemi doniczkowej. Można zastosować większą ilość wody zachowując zalecaną dawkę nicieni.

Liczba nicieni w opakowaniu	Rozpuść w	Wystarczy na powierzchnię	Wystarczy na objętość podłoża
2,5 miliona	5 litrach wody	5 m ²	50 litrów
5 milionów	10 litrach wody	10 m ²	100 litrów
10 milionów	20 litrach wody	20 m ²	200 litrów
25 milionów	50 litrach wody	50 m ²	500 litrów

1 L podłoża to objętość mieszcząca się w doniczce o średnicy 12 cm i wysokości 10 cm.