

dobrze.

nicienie do zwalczania rolnic, larw komarnic, turkuciowatych i innych

nemastar' (*Steinernema carpocapsae*)

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Najlepiej zastosować nicienie jak najszybciej po dostarczeniu.

Jeśli to konieczne, produkt można przechowywać w temperaturze 4-8°C (w lodówce) do daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 35°C.

Termin zastosowania:

Nicienie można stosować przez cały rok. Ważne aby były one zastosowane w czasie występowania larw zwalczanych szkodników.

Warunki stosowania:



Nie stosować w pełnym słońcu.

min 14°C



Nicienie są efektywne w temperaturze gleby/podłoża od 14°C. W niższych temperaturach skuteczność nicieni spada. Powierzchnia gleby podczas aplikacji powinna być wilgotna i powinna pozostać wilgotna przez dwa tygodnie. Co oznacza, że po aplikacji należy regularnie podlewać rośliny aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża. Nicienie giną w suchych warunkach.

Wskazówki dla efektywnego zwalczania larw w glebie:

Nicienie mogą być stosowane interwencyjnie (w czasie występowania larw) co 4 tygodnie lub prewencyjnie (zapobiegawczo) co 6 tygodni.

Nicienie atakują larwy szkodników znajdujących się w glebie, dlatego w celu efektywnej ochrony należy zapoznać się z biologią zwalczanego szkodnika i stosować nicienie w odpowiednim czasie.

Kluczowym warunkiem działania jest temperatura gleby – musi ona wynosić co najmniej 12°C przez kilka godzin w ciągu doby, aby nicienie mogły aktywnie poszukiwać swoich żywicieli.

DYSTRYBUTOR:
BIOCONT Polska sp. z o.o.
Ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków
tel: +48 795 999 178
www.biocont.pl

PRODUCENT:
e-nema
Klausdorfer Str. 28 - 36,
24223 Schwentental, Niemcy
www.e-nema.de

dobrze.

nicienie do zwalczania rolnic, larw komarnic, turkuciwatych i innych

nemastar® (*Steinernema carpocapsae*)



INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZABIEGU I APLIKACJI

1. Otwórz saszetkę z nicieniami i wsyp całą zawartość do czystego pojemnika (np. słoika, kubeczka lub miski).
2. Dodaj niewielką ilość wody (wystarczająco dużo, aby zawartość łatwo się mieszała i nie tworzyła grudek). Następnie delikatnie wymieszaj, aż uzyskasz zawiesinę bez większych grudek.
3. Wlej gotową zawiesinę bezpośrednio do konewki i dolej resztę wody, aż uzyskasz pożądaną objętość (zgodnie z zaleceniami z etykiety).
4. Podlewaj rośliny tak, aby pokryć całą powierzchnię doniczki. Mieszaj lub potrząsaj konewką co jakiś czas w trakcie podlewania. Dzięki temu nicianie nie osiadną na dnie i będą równomiernie aplikowane.

WSKAZÓWKI!

Wsypanie saszetki prosto do pełnej konewki utrudnia wymieszanie, przez co nicianie mogą osiąść na dnie i nie zostaną równomiernie rozniesione lub zlepić się w grudki zatykające otwory konewki.

Pamiętaj, aby podłoże było wilgotne przed i po aplikacji. Nicianie najlepiej działają w wilgotnej glebie!

DAWKOWANIE

Ogólna dawka wynosi 0,25–0,5 miliona nicieni na 1 m²

Nicianie można rozpuścić w mniejszej objętości wody jeśli ma to ułatwić aplikację. Należy jednak pamiętać o obfitym podlaniu podłoża w miejscach gdzie były aplikowane nicianie po aplikacji!

Liczba nicieni w opakowaniu	Rozpuść w	Wystarczy na powierzchnię
2,5 miliona	5 litrów wody	5 m ²
5 milionów	10 litrów wody	10 m ²
10 milionów	20 litrów wody	20 m ²
25 milionów	50 litrów wody	50 m ²

Podlewanie podłoża po aplikacji jest wskazane! Nicianie lepiej rozprzodkują się w profilu gleby w wilgotnych warunkach. Nie dopuszczać do przesuszenia podłoża po aplikacji nicieni.