

#### Logo após a alta hospitalar

Agendar primeira consulta com pediatra na primeira semana de vida

Coletar teste do pezinho entre 3º e 5º dia de vida

Verificar vacinas (hepatite B e BCG) - caso não tenham sido realizadas, fazê-las nos primeiros dias de vida (procurar a unidade básica de saúde).

### Sono seguro

O bebê SEMPRE deve dormir de barriga para cima, isso evita a morte súbita infantil.

A superfície de dormir deve ser firme e reta. Não utilizar travesseiros, protetores de berço e nada que possa cair em cima do bebê.

O bebê não pode dormir na mesma cama dos pais devido ao risco de asfixia. Sempre coloque seu bebê no berço próprio, é mais seguro!

# Sono seguro

Posição segura para dormir:



#### Banho do bebê

Banhos de imersão são mais recomendados, pode-se usar uma fralda de pano enrolada durante o banho, sendo retirada durante a higiene para melhor conforto do bebê.

Temperatura ideal da água: entre 37 - 37,5°C

Duração: entre 5 a 10 minutos

Utilizar apenas produtos de recém-nascido

### Higiene

Não utilize talco ou maisena! O bebê pode inalar o pó e causar problemas respiratórios graves!

Não utilizar perfume no bebê (e evitar usar nos adultos que cuidam do bebê também)

Evitar lenço umedecido para troca de fraldas, preferir usar gaze e água

## Alimentação

Aleitamento materno exclusivo em **livre demanda** (ou seja, sempre que o bebê quiser), até os 6 meses de vida (exceto se outras orientações fornecidas pelo seu pediatra).

Com o leite materno, o bebê não precisa nem de água, pois no leite materno já tem tudo que o bebê precisa! Não dê chás, água ou qualquer outro alimento além do leite materno.





#### Cólicas

Cólicas são comuns nos primeiros 3 meses, devido ao desenvolvimento digestivo do bebê.

É normal o bebê evacuar a cada mamada, bem como pode ficar até 7-10 sem evacuar.

A consistência das fezes normalmente é amolecida. Não é normal fezes esbranquiçadas e/ou sangramento nas fezes



# Sinais de alarme

Fique atento, esses sinais indicam que você deve ir imediatamente ao plantão (e não esperar para a consulta agendada):

- Febre: Temperatura axilar maior ou igual a 37,5°C.
- "Amarelão"
- Vermelhidão, secreção ou odor fétido ao redor do umbigo
- Sinais de esforço para respirar
- Sonolência excessiva
- Coloração da pele arroxeada
- Choro excessivo que n\u00e3o acalma

# Outros

Evitar locais aglomerados e fechados

Todos em casa devem estar com suas vacinas em dia - se vacinar também é proteger o seu bebê!

Não utilizar bico / chupeta se possível ela poderá atrapalhar a amamentação, e não irá trazer benefícios.

Não expor o bebê ao sol, não existe exposição segura ao sol para um recém nascido.

### Lembrem-se:

Papais e Mamães:

Vocês não estão sozinhos! É normal terem dúvidas, inseguranças e cansaço!

#### Peçam ajuda sempre que precisarem!

O bebê de vocês não precisa de pais que saibam tudo, mas sim de pais que estão dispostos a cuidá-lo e amá-lo! Vocês já são incríveis!

Boa sorte nessa jornada!

