

ANTICOCCIDIANO



AMPROSULF-L

AMPROLIO/SULFAQUINOXALINA

REGISTRO: Q-10169-004

tmvfarm.com.mx

Nuestra línea de coccidicidas está diseñada contra las infestaciones por coccidios, uno de los desafíos más comunes en la producción pecuaria. Estos productos permiten mantener la salud intestinal de sus animales, asegurando que alcancen su máximo potencial de crecimiento.

USO VETERINARIO SOLUCIÓN ORAL





tmvfarm.com.mx

ANTICOCCIDIANO



AMPROSULF-L

AMPROLIO/SULFAQUINOXALINA

FÓRMULA:

CADA 1000 mL.

CONTIENEN:

Amprolio	125 g
Sulfaquinoxalina	80 g
Vehículo c.b.p.	1000 mL

INDICACIONES:

Para la prevención y tratamiento de la Coccidiosis intestinal y cecal en pollos, gallinas y pavos, ocasionadas por *Eimeria necatrix*, *E. tenella.*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. brunetti*. El producto, proporciona mayor eficacia en el control de brotes de especies mixtas de coccidias.

ESPECIES: Aves (engorda, reemplazo, reproductoras) pavos.

CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE
RECETA MÉDICA

DOSIS:

Aves: administrar 1 a 2 litros de AMPROSULF - L / 1,000 litros de agua de bebida, equivalente a 20 mg / kg de peso corporal de Amprolio y 10 mg / kg de Sulfaquinoxalina, por 48 horas seguidas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro: 10 días, antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No consumir productos derivados comestibles hasta 10 días después de la última aplicación. **Seguridad ambiental:** los envases y residuos de **AMPROSULF - L**, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.



PRESENTACIONES:

1, 5, y 20 L.