

ANTIMICROBIANO



FARMIFLOR PX

FLORFENICOL

REGISTRO: Q-10169-051



tmvfarm.com



NUESTRA LÍNEA DE ANTIMICROBIANOS HA SIDO DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA ABORDAR LAS COMPLEJAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA PECUARIA. ESTOS PRODUCTOS NO SOLO SON EFECTIVOS EN EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES BACTERIANAS, SINO QUE TAMBIÉN REPRESENTAN UNA BARRERA PROTECTORA CRUCIAL PARA LA SALUD DE SUS ANIMALES.

USO VETERINARIO PREMEZCLA MEDICADA





ANTIMICROBIANO



FARMIFLOR PX

FLORFENICOL

tmvfarm.com



***PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.**

FÓRMULA:

CADA 1000 ml.

CONTIENEN:

Florfenicol	40 g
Excipiente c.b.p.	1000 g

INDICACIONES:

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en aves (Pollo de engorda, remplazo, reproductoras) y porcinos (Destete, Crecimiento y Finalización), ocasionadas por microorganismos Gram+ y Gram -, susceptibles al Florfenicol como: *Actinobacillus sp*, *Pasteurella sp*, *Haemophilus sp*, *Actinomyces sp*, *Salmonella choleraesuis*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus sp* y *Staphylococcus sp*.

ESPECIES:

Aves (engorda, remplazo, reproductoras), y porcinos (Destete, Crecimiento, Finalización).

DOSIS:

AVES: Adicionar 5 kg / 500 kg alimento lo equivalente a 20 mg de Florfenicol de 5 a 7 días consecutivos.

PORCINOS: Adicionar 5 kg /500 kg de alimento equivalente a 20 mg/kg de Florfenicol de 5 a 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

ORAL, MEZCLADO EN EL ALIMENTO.

ADVERTENCIAS:

GENERAL: No utilizar simultáneamente con otros antimicrobianos.

PORCINOS: No usar en finalización de cerdos, destinados al consumo humano. No utilizar en verracos destinados a la reproducción. No administrar en casos de reacciones alérgicas al Florfenicol. Se ha observado que después de la administración se puede presentar diarrea, inflamación perianal y prolapso rectal. También se puede observar aumento de calcio en suero. Gestación, lactancia y fertilidad: La seguridad del producto durante la gestación y la lactancia no se ha estudiado en las cerdas. Por lo tanto, no se recomienda la administración durante la gestación y la lactancia. Interacción con otros medicamentos y otras formas de Interacción: No se conocen. **AVES:** No usar el producto en gallinas ponedoras 20 días antes de romper postura. No usar el producto en aves de postura en etapa de producción de huevo para consumo humano. **Tiempo de retiro:** No se administre este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No se administre este producto en aves cuyos huevos son destinados al consumo humano.. Seguridad ambiental: los envases y residuos de FARMIFLOR PX, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT. **PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.**

CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE
RECETA MÉDICA



PRESENTACIONES:

25 Kg.