

ANTIMICROBIANO



FARMIFLOR-PX

FLORFENICOL

REGISTRO: Q-10169-051



tmvfarm.com.mx

Nuestra línea de antimicrobianos ha sido diseñada específicamente para abordar las complejas necesidades de la industria pecuaria. Estos productos no solo son efectivos contra infecciones bacterianas, sino que también representan una barrera protectora crucial para la salud de sus animales.

**USO VETERINARIO
PREMEZCLA
MEDICADA**





tmvfarm.com.mx

ANTIMICROBIANO



FARMIFLOR-PX

FLORFENICOL

FÓRMULA:

CADA 1000 g.
CONTIENEN:

Florfenicol	40 g
Excipiente c.b.p.	1000 g

INDICACIONES:

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en aves (Pollo de engorda, remplazo, reproductoras) y porcinos (Destete, Crecimiento y Finalización), ocasionadas por microorganismos Gram+ y Gram -, susceptibles al Florfenicol como: *Actinobacillus sp.*, *Pasteurella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Actinomyces sp.*, *Salmonella cholerasuis*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus sp* y *Staphylococcus sp.*

ESPECIES:

Aves (engorda, reemplazo, reproductoras), y porcinos (destete, crecimiento, finalización).

DOSIS:

AVES: Adicionar 20 mg/kg de Florfenicol de 5 a 7 días consecutivos.

PORCINOS: Adicionar 20 mg/kg de Florfenicol de 5 a 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

ADVERTENCIAS:

GENERAL: No utilizar simultáneamente con otros antimicrobianos. **PORCINOS:** No usar en finalización de cerdos, destinados al consumo humano. No utilizar en verracos destinados a la reproducción. No administrar en casos de reacciones alérgicas al Florfenicol. Se ha observado que después de la administración se puede presentar diarrea, inflamación perianal y prolapso rectal. También se puede observar aumento de calcio en suero. **Gestación, lactancia y fertilidad:** La seguridad del producto durante la gestación y la lactancia no se ha estudiado en las cerdas. Por lo tanto, no se recomienda la administración durante la gestación y la lactancia. Interacción con otros medicamentos y otras formas de Interacción: No se conocen. **AVES:** No usar el producto en gallinas ponedoras 20 días antes de romper postura. No usar el producto en aves de postura en etapa de producción de huevo para consumo humano. **Tiempo de retiro:** No se administre este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No se administre este producto en aves cuyos huevos son destinados al consumo humano. **Seguridad ambiental:** los envases y residuos de **FARMIFLOR-PX**, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO POR DEBAJO DE 25°C, PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.**

PRESENTACIONES:

25 kg.

