

ANTIMICROBIANO



TIAMUFARM 450

TIAMULINA FUMARATO HIDROGENADO

REGISTRO: Q-10169-046



tmvfarm.commx

Nuestra línea de antimicrobianos ha sido diseñada específicamente para abordar las complejas necesidades de la industria pecuaria. Estos productos no solo son efectivos contra infecciones bacterianas, sino que también representan una barrera protectora crucial para la salud de sus animales.

**USO VETERINARIO
POLVO ORAL
SOLUBLE**





tmvfarm.com.mx

ANTIMICROBIANO



TIAMUFARM 450

TIAMULINA FUMARATO HIDROGENADO

FÓRMULA:

CADA 1000 g.

CONTIENEN:

Tiamulina Fumarato	
Hidrogenado	450 g
Excipiente c.b.p.	1000 g

INDICACIONES:

Antimicrobiano diperteno indicado para el tratamiento de enfermedades del tracto digestivo y respiratorio en aves (pollo de engorda, reemplazo, reproductoras) y porcinos (destete, crecimiento y finalización) ocasionadas por microorganismos Gram + y -, como *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Lawsonia intracellularis*, que ocasionan alguna enfermedad respiratoria, digestiva o sistémica.

ESPECIES: Aves (engorda, reemplazo, reproductoras) y porcinos (destete, crecimiento, finalización).

DOSIS:

AVES: Adicionar 500 g / 1,000 L de Agua de bebida, equivalente a 20 mg por kg de peso vivo de 3-5 días consecutivos.

PORCINOS: Adicionar 500 g / 1,000 L de Agua de bebida, equivalente a 20 mg por kg de peso vivo de 3-5 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro: No se administre este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No se administre este producto en aves cuyos huevos son destinados al consumo humano. **Seguridad ambiental:** los envases y residuos de **TIAMUFARM 450**, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT. **Contraindicaciones:** No debe administrarse a los animales que tienen acceso a los alimentos que contienen antibióticos ionóforos poliéter (Monensina, Lasalosid, Narasina, Salinomycin y Maduramicina) como se pueden presentar reacciones adversas. Su uso con otros principios activos que se unen a las subunidades 50S ribosomal (Lincomicina, Eritromicina y Tilosina, puede conducir a la disminución de la eficacia como resultado de la competencia en el sitio activo concomitante. **MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. MANTÉNGASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO POR DEBAJO DE 25°C, PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA. PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.**

PRESENTACIONES:

5, 10 y 20 kg.