

ANTICOCCIDIANO



AMPROSULF L

AMPROLIO / SULFAQUINOXALINA

REGISTRO: Q-10169-004



NUESTRA LÍNEA DE ANTICOCCIDIANOS ESTÁ DISEÑADA PARA PREVENIR Y CONTROLAR LAS INFESTACIONES POR COCCIDIOS, UNO DE LOS DESAFÍOS MÁS COMUNES EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA. ESTOS PRODUCTOS PERMITEN MANTENER LA SALUD INTES-TINAL DE SUS ANIMALES, ASEGURANDO QUE ALCANCEN SU MÁXIMO POTENCIAL DE CRECIMIENTO.

USO VETERINARIO SOLUCIÓN ORAL





@tmvfarmoficial

ANTICOCCIDIANO



AMPROSULF L

AMPROLIO / SULFAQUINOXALINA

***PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.**

FÓRMULA:

**CADA 1000 ml.
CONTIENEN:**

Amprolio	125 g
Sulfaquinoxalina	80 g
Vehículo c.b.p.	1000 ml

INDICACIONES:

Para la prevención y tratamiento de la Coccidiosis intestinal y cecal en pollos, gallinas y pavos, ocasionadas por *Eimeria necatrix*, *E. tenella.*, *E. acervulina*, *E. máxima*, *E. brunetti*. El producto, proporciona mayor eficacia en el control de brotes de especies mixtas de coccidias.

ESPECIES: Aves (engorda, remplazo, reproductoras), pavos.

DOSIS:

Aves: administrar 1 a 2 litros de AMPROSULF L / 1,000 litros de agua de bebida, equivalente a 20 mg / kg de peso corporal de Amprolio y 10 mg / kg de Sulfaquinoxalina, por 48 horas seguidas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

ORAL, DISUELTO EN AGUA DE BEBIDA

ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro: 10 días, antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No consumir productos derivados comestibles hasta 10 días después de la última aplicación. **Seguridad ambiental:** los envases y residuos de AMPROSULF L, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

PRESENTACIONES:

250ml, 1, 5 y 20L.

**CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO**

**SU VENTA REQUIERE
RECETA MÉDICA**

