

Instructivo de uso

Polarizadores para salud
Clinic y Pulse





Polarizador Clinic



Polarizador Pulse



Polarizador Pulse XL





División Salud
Ciencia que te cuida

Ficha Técnica

Polarizador Clinic



Peso:	220 gramos aprox.
Material:	acero inoxidable
Vida Útil:	20 años

Polarizador Pulse



Peso:	50 gramos aprox.
Material:	acero inoxidable (el extensible es de silicona o piel)
Vida Útil:	20 años

Polarizador Pulse XL



Peso:	105 gramos aprox.
Material:	acero inoxidable (el extensible es de silicona o piel)
Vida Útil:	20 años

Principio Científico

El polarizador emite campos de fuerza que interactúan con los iones y moléculas al entrar en contacto con ellos.

Al agitar el Polarizador Clinic en líquidos y llevar el Polarizador Pulse en la muñeca, los campos de fuerza generados por estos dispositivos modifican la energía de enlace entre átomos y moléculas.

Este proceso genera soluciones menos viscosas, con mayor capacidad de difusión y propiedades hidratantes mejoradas.

Como resultado, se optimizan la circulación, la digestión, los procesos antiinflamatorios y la difusión en el cuerpo.



Digestión



Difusión



Circulación



Procesos
Antiinflamatorios

Beneficios de la Polarización



Digestión

La reducción en la energía de enlace de los compuestos químicos disueltos en agua polarizada **disminuye la cantidad de energía requerida para realizar las reacciones químicas en el cuerpo, incluyendo los procesos digestivos.**



Difusión

Además, al reducir la energía de enlace tanto intermolecular como interatómica, disminuye la densidad del agua, **permitiendo una difusión más eficiente de las sustancias disueltas.** Esto también **mejora la asimilación de cualquier medicamento,** haciéndolos más efectivos.



Circulación

Un agua menos densa no solo mejora la difusión de las sustancias disueltas, sino que también **facilita la circulación de la sangre,** optimizando el transporte de nutrientes, oxígeno y desechos metabólicos en el organismo.



Procesos Antiinflamatorios

Como resultado de la mejora en la digestión, la circulación y los procesos de difusión, también **se potencian los mecanismos naturales del cuerpo para combatir la inflamación.**

Aplicaciones

El Polarizador Macosay para la salud es un tratamiento físico y no invasivo que incluye la ingesta de líquidos previamente agitados con el Polarizador Clinic, y el uso del Polarizador Pulse, o Pulse XL, como si fuera un reloj de pulsera. Además, la polarización es compatible con cualquier tratamiento, ya sea homeopático o alopático, sin interferencias.

Polarizador Clinic



Se utiliza para tratar:

- Ciática
- Estreñimiento
- Gastritis
- Hemorroides
- Migraña
- Enfisema pulmonar

Polarizador Clinic + Pulse (*Pulse XL)



Se utiliza para tratar:

- Ácido Úrico
- Alergia
- Aterosclerosis
- Artritis*
- Diabetes*
- Hipertensión
- Daños de la quimioterapia*
- Fibromialgia
- Trombosis
- Disautonomía
- Piedras en vesícula y riñón

Modo de empleo

Polarizador Clinic



El Polarizador Clinic se utiliza de dos maneras:

1. Agitando los líquidos antes de ingerirlos.
2. Frotando el producto en las áreas donde se siente dolor.

Agitación

1. Caliente el líquido a ingerir

Utilice agua, café, té, consomés, caldos u otra bebida de su elección.

2. Prepare el recipiente

Seleccione una taza o vaso de cualquier material y vierta en él el líquido previamente calentado.

3. Agite el líquido

- Agite con el Polarizador Clinic durante 1 a 2 minutos antes de ingerir.
- Una vez superada la etapa de dolor, el tiempo de agitación puede reducirse a 30 segundos.
- Agite con la mayor velocidad posible, teniendo cuidado de no derramar el líquido ni dañar el recipiente.
- El sentido de la agitación (hacia la derecha o izquierda) no afecta la eficacia del Polarizador Clinic.

4. Mantenga el polarizador en el recipiente

Después de agitar, deje el Polarizador Clinic dentro de la taza o vaso y realice agitaciones periódicas mientras consume el líquido.

Recomendaciones para el Uso del Polarizador Clinic

1. Cantidad diaria de líquidos

Para obtener resultados satisfactorios en la eliminación de la dolencia, es necesario ingerir dos litros de líquidos calientes al día.

2. Distribución de la cantidad de líquidos

Esta cantidad debe ser consumida a lo largo del día, no en una sola toma.

3. Agitación por vaso

Se debe agitar cada taza o vaso antes de tomarlo, no los dos litros de líquidos de una sola vez.

4. Precauciones en caso de pérdida excesiva de peso

Si se experimenta pérdida de peso excesiva, se recomienda reducir la cantidad de líquidos ingeridos al día o disminuir su temperatura.

- Al hacer estos ajustes, es importante tener en cuenta que los resultados de la polarización pueden retrasarse.

5. Efectos de ingerir más de dos litros

Superar los dos litros de líquidos calientes al día podría ocasionar:

- Decaimiento
- Pérdida excesiva de peso

6. En caso de dolor o presión arterial elevada

Si se presenta dolor o presión arterial elevada, se debe **consumir tres vasos de agua polarizada de inmediato**.

Temperatura de los Líquidos

1. Temperatura recomendada

La temperatura de los líquidos a ingerir debe ser la más alta que usted pueda tolerar sin quemarse la boca o la lengua.

2. Referencia de temperatura promedio

La temperatura promedio recomendada es similar a la de los líquidos calentados en un horno de microondas durante 1:30 minutos. Sin embargo, dado que cada cuerpo es diferente, la temperatura puede variar de una persona a otra, dependiendo del calor que cada individuo pueda soportar.

3. Eficiencia de la polarización

Mientras mayor sea la temperatura del líquido, mayor será la eficiencia de la polarización, lo que a su vez reduce el tiempo necesario para observar resultados.

4. Recomendaciones para personas con hipotensión

En personas con hipotensión (presión baja), se recomienda consumir líquidos tibios en lugar de calientes, ya que los líquidos calientes pueden disminuir aún más la presión arterial. En personas sin hipotensión, la temperatura de los líquidos debe ser alta.

Frotación del Polarizador Clinic

En algunos casos de enfermedades que provocan dolor o inflamación, además de utilizar el Polarizador Clinic para agitar los líquidos a ingerir, es fundamental frotar las zonas afectadas con el equipo. A continuación, se detallan las áreas específicas a tratar:

- **Artritis:** Frotar la zona del dolor.
- **Ciática:** Frotar la zona del dolor.
- **Estreñimiento:** Frotar la zona del vientre.
- **Gastritis:** Frotar la zona del dolor.
- **Migraña:** Frotar el cuello y la zona del dolor.
- **Fibromialgia:** Frotar la zona del dolor.
- **Trombosis:** Frotar la zona del dolor.
- **Diabetes:** Frotar los muslos de ambas piernas, brazos y vientre.

Nota: No se recomienda la frotación del Polarizador Clinic en mujeres embarazadas.

Limpieza del Polarizador Clinic

Lave el Polarizador Clinic con agua y jabón después de cada uso, tal como lo haría al limpiar utensilios de cocina, como una cuchara o un tenedor.

Polarizador Pulse



El Polarizador Pulse complementa el tratamiento de diversas enfermedades (consulte el tratamiento específico para cada caso).

Modo de colocación

- El Polarizador Pulse generalmente se coloca en la muñeca de cualquier brazo.
- La base del dispositivo debe estar en contacto con la cara interior de la muñeca, como si fuera un reloj invertido (como en la siguiente imagen).



Cara lisa (en contacto con la piel)



Cara con bisel

Modo de empleo específico

Para enfermedades o dolencias específicas, el Polarizador Pulse puede colocarse de las siguientes maneras:

- **Hipertensión:** Colocar en la muñeca derecha.
- **Pierna inflamada:** Adherir en la zona inflamada.
- **Vesícula inflamada:** Adherir en la zona vesicular hasta que la inflamación desaparezca.
- **Espolón:** Adherir en la zona del tobillo hasta que el dolor desaparezca.
- **Hígado inflamado:** Adherir en la zona hepática hasta que la inflamación ceda.
- **Piedras en la vesícula o riñón:** Adherir en la zona vesicular hasta que las piedras se eliminen.

Nota: Para adherir el Polarizador Pulse a la zona afectada puede utilizar micropore o una venda.

Importante

El uso del Polarizador Pulse es complementario al tratamiento y no sustituye la ingesta de líquidos polarizados.



Observaciones Generales para el uso de los Polarizadores Clinic y Pulse (Pulse XL)

Duración del Tratamiento de Polarización

El tratamiento con el Polarizador Clinic y el Polarizador Pulse consta de dos fases:

Fase 1: Etapa de crisis de la enfermedad

Objetivo: Eliminar las molestias, dolores e inflamación relacionados con la enfermedad a tratar.

Duración promedio: De 15 a 60 días, dependiendo de los siguientes factores:

- Grado de avance de la enfermedad: Enfermedades más avanzadas pueden requerir más tiempo.
- Cantidad de agua ingerida: A mayor cantidad de agua polarizada, menor será el tiempo necesario.
- Temperatura del agua: A mayor temperatura, mayor eficacia y menor duración del tratamiento.
- Tiempo de frotación del Polarizador Clinic: Frotar más tiempo mejora los resultados.
- Tiempo de uso del Polarizador Pulse: Una aplicación adecuada acelera la mejora.

Durante esta fase, se observará una reducción significativa del dolor, la inflamación y otros síntomas.

Fase 2: Prevención y mantenimiento

Inicio: Desde que los síntomas y dolores han sido controlados.

Duración: Indefinida.

Objetivo: Prevenir enfermedades relacionadas con la circulación, digestión y procesos inflamatorios, tales como:

Circulación: Hemofilia, trombosis, hemorroides, entre otras.

Digestión: Gastritis, colitis, reflujo gástrico, entre otras.

Procesos antiinflamatorios: Enfermedades como Parkinson y Alzheimer, entre otras.

Recomendaciones durante la Fase 2

- Se puede reducir la cantidad de líquidos polarizados ingeridos a 0.5 o 1 litro al día, dependiendo de las necesidades personales.
- En enfermedades con inflamación o dolor, una vez eliminados estos, el Polarizador Pulse puede ser utilizado en la muñeca de cualquier brazo para mantener el bienestar general.

Polarización Preventiva

Polarización en personas sanas

La polarización es una práctica recomendable para personas sanas que desean mejorar el desempeño de las funciones de su organismo y prevenir enfermedades.

En la etapa de prevención, no es imprescindible consumir agua polarizada a altas temperaturas. Si la persona lo prefiere, puede optar por utilizar líquidos tibios o fríos para la polarización.

Polarización en bebés

- Cólicos severos: agite la leche con el Polarizador Clinic antes de verterla en el biberón.
- Rozaduras: hierva agua y agítela con el Polarizador Clinic. Deja que el agua se enfríe con el Polarizador dentro del recipiente. Una vez fría, utiliza el agua para aplicar en las zonas afectadas por rozaduras.

Consideraciones acerca de la Polarización

Posibles Efectos Iniciales

Algunas personas pueden experimentar síntomas leves durante los primeros días del tratamiento, tales como:

- Mareos
- Incremento del dolor (en casos de enfermedades dolorosas)

- Reducción de peso
- Diarreas no infecciosas (más prolongadas en pacientes con hígado graso)
- Sabor metálico en el agua

Estos efectos son temporales y suelen desaparecer en pocos días.

Beneficios de la Polarización

- Las heridas, tanto en diabéticos como en no diabéticos, sanan más rápido al lavarse con agua polarizada. Se recomienda seguir el procedimiento indicado para tratar rozaduras en bebés.
- La polarización es adecuada para personas de cualquier edad y estado de salud, incluyendo mujeres embarazadas.
- La polarización no interfiere con ningún tratamiento médico. Por el contrario, mejora la eficacia de los medicamentos. Se sugiere tomar los fármacos con agua polarizada fría para facilitar la ingesta.

Notas Importantes

- La polarización no genera efectos colaterales.
- La polarización no destruye las células cancerosas, sino que reduce de manera significativa los efectos secundarios adversos de la quimioterapia.

Precauciones

- No acerque los Polarizadores Clinic y Pulse al corazón en personas con marcapasos.
- Evite el contacto de los polarizadores con equipos electromagnéticos (televisores, computadoras, etc.).
- No exponga los polarizadores al fuego directo.
- El extensible y los pernos del Polarizador Pulse pueden ser reemplazados por el usuario.

Supervisión Médica

- No abandone su tratamiento médico sin la autorización de su médico.

Pruebas de la Polarización

Incremento de Espuma

1. Lávese las manos dos veces con su jabón de barra habitual para eliminar suciedad y grasa.
2. Lávese una tercera vez con el mismo jabón y observe la cantidad y calidad de espuma generada.
3. Tome aproximadamente 200 ml de agua de la misma llave y agítela durante dos minutos con el Polarizador Clinic.
4. Utilice el agua polarizada para lavar sus manos nuevamente con el mismo jabón. Compare la cantidad y calidad de espuma generada con el agua no tratada.
5. La producción y calidad de la espuma mejoran debido al aumento de energía de hidratación e hidrólisis del agua polarizada.

Modificación del Sabor de Bebidas Alcohólicas

1. Cate una bebida alcohólica fuerte, como tequila, y evalúe su sabor.
2. Agite la bebida con el Polarizador Clinic durante uno o dos minutos.
3. Cate nuevamente la bebida y percibirá un cambio en su sabor.

Eliminación de Gases en Refrescos

1. Sirva un refresco (preferentemente de cola) en un vaso y pruébelo.
2. Agite el refresco con el Polarizador Clinic durante uno o dos minutos.
3. Pruebe el refresco nuevamente y notará una disminución en la concentración de CO_2 .

Reducción de la Dureza del Agua

1. Realice una prueba inicial de dureza del agua (con un análisis titrimétrico para mayor precisión).
2. Agite la misma muestra de agua con el Polarizador Clinic durante uno o dos minutos.
3. Repita el análisis de dureza y observará una reducción del 3% al 10%.



Polarizador Clinic



Polarizador Pulse



Polarizador Pulse XL





Polarizadores diseñados y fabricados en México por:



+52 999 921 5694
contacto@grupomacosay.com
grupomacosay.com