

// MENTORA

LETICIA DUARTE

MEDICAMENTOS


2025





LOROTADINA

Uso em caso de reações alérgicas leve





ADRENALIN A INJETÁVEL

Indicado para o tratamento de situações de emergência com reações alérgicas graves ou anafilaxia





TORAGESIC


Pode administrar 30min antes para analgesia caso paciente não esteja medicado.





MIDAZOLAN


Sedativo, ansiolítico. Primeira opção para quando paciente apresenta hipertensão por ansiedade.





CAPTOPRIL

opção para reduzir a pressão. Administrar até 2x com intervalo de 15 a 20 minutos.





TRANSAMIN

injetável e uso oral: o injetável para auxílio em casos de sangramento abundante/hemorragia, aplicar intramuscular ou direto no local do sangramento. Administrar um cp via oral após o procedimento. obs: tomar cuidado enquanto ao uso dessa medicação em pacientes com histórico de trombose.





HIALURONIDASE

Pode ser **utilizada para tratamentos de hematomas e intercalado com triancil para tratamento de fibroses.**

Frasco de Hialuronidase de **2000 UTR** – Adicione 2mL de diluente

Seringa de insulina 1 mL = 1000 UTRs

Cada traço irá disponibilizar 20 UTRs

Protocolo:

Sobre correção = 10 a 20 UTRs (a cada 2,5 mm)

Risco de necrose = 500 UTRs (por área).





— TRIANCIL

pode ser utilizada para tratamentos de hematomas e intercalado com triancil para tratamento de fibroses.





DIPROGENTA

é eficaz no alívio de inflamações e infecções de pele devido à sua ação anti-inflamatória e antibacteriana rápida.



APLICAÇÃO

“ ”

Aplicar a cada 10 dias e manter
acompanhamento com a
fisioterapeuta até melhorar.

Iniciar fisio após 48 horas da
aplicação.

ANTIFIBRINOLÍTICO (CONTROLE OU PREVENÇÃO DE SANGRAMENTOS):

- Transamin 250mg: tomar 2 comp 1h antes. Manter o uso 3x ao dia por 03 dias em caso onde haja hemorragia na cirurgia.



ANALGÉSICOS:

- Dipirona 01 grama | Tomar 01 cp de 06 em 06 horas em caso de dor, iniciar uma hora antes
- Toragesic sublingual de 8/8h por 4 dias em caso de dor
- Para dores mais fortes: Tylenol, tramadol

CORTICOIDES:

- Diprospan | 01 ampola um dia antes do procedimento (farmácia)
- Predsin 40mg de 12/12h por 4 dias em casos de cirurgias mais traumáticas

PARA HEMATOMAS:

- Trombofobe: Passar 3x ao dia no local até desaparecerem os hematomas
- Hialuronidase: Aplicar na região no retorno



ANTIBIÓTICO:

- Cefalexina 500mg | Tomar 01 cápsula de 12 em 12 horas ou 08 e 08 por 07 dias

PARA CICATRIZ (SOMENTE QUANDO HOUVER REMOÇÃO DE TECIDO):

- Rifocina: 3x ao dia até fechamento completo da ferida
- Mupirocina: passar 3x ao dia do 5º ao 15º dias
- Contractubec: passar 3x do 15º dia até o 30º dia
- Kelo Cote: 3x ao dia do 30º dia até melhorar 100% em caso de cicatriz hipertrófica
- Aquaphor: pomada curativa, excelente para reparação. Pode ser utilizada durante todo período após remoção de sutura



ANTIPROTOZOÁRIO:

- Metronidazol 400mg | Tomar 1 comp de 12/12h por 7 dias em casos de remoção de tecido maior (em T)

PARA TRATAMENTO DE ALERGIAS NA PELE:

- Bepantol na região e Aquaphor. Em alguns casos pode ser necessário o uso de pomada com corticoide como hidrocortisona 1% de leve intensidade ou Betametasona de média intensidade. Pode ser administrado Loratadina em caso de coceira.

