TEP-PSMA et approche théranostique dans le cancer de la prostate

Dr Ghoufrane TLILI, Service de Médecine Nucléaire, CHU de Bordeaux

ghoufrane.tlili@chu-bordeaux.fr

05/06/2025

AFTMN

Association Française des Techniciens en Médecine Nucléaire

Cancer de la prostate

Données de l'INCa,
édition 2024

Marqueur tumoral : PSA

Cancer de la prostate - classifications

<i>T = Tumeur primitive</i>	<i>N = Ganglions régionaux</i>	<i>M = Métastases à distance</i>
T0 non retrouvée	Nx non évalué	Mx non évalué
T1 non palpable non visible en imagerie	N0 absence d'atteinte	M0 absence d'atteinte métastatique à distance
T2 limitée à la prostate T2a < 50% d'un lobe T2b > 50% d'un lobe T2c bilatéral	N1 atteinte ggl régionale <i>NB : ggl iliaques int. et ext.</i> <i>NB : N1m si < 0.2cm</i>	M1 métastases M1a ganglions non régionaux M1b atteinte osseuse M1c autres atteintes +/- os
T3 extension extra-prostatique T3a uni ou bilatéral T3b vésicule(s) séminale(s)		
T4 tumeur fixée ou autres atteintes locales sphincter externe, rectum, périnée		

<i>R = reliquat tumoral - limites d'exérèse</i>
Rx non évalué
R0 marges négatives
R1 marges atteintes

→ **Lymphophile et ostéophile +++**

Diagnostic au **stade localisé** dans **80%** des cas

Survie
93% à 5 ans
80% à 10 ans

Cancer de la prostate - classifications

Gleason score	ISUP grade
2-6	1
7(3+4)	2
7(4+3)	3
8(4+4 or 3+5 or 5+3)	4
9-10	5

<i>Classification d'Amico</i>					
faible risque	PSA < 10ng/ml	ET	ISUP 1	ET	T1c ou T2a
risque intermédiaire	PSA 10-20ng/mL	ET	ISUP 2 ou 3	ET	T2b
risque élevé	PSA > 20ng/ml	OU	ISUP > 3	OU	T2c

IRMmp

SO + TAP

TEP
PSMA

PSMA

Prostate Specific Membrane Antigen

= glutamate carboxypeptidase II (GCP-II),

= FOLH1

zinc-protéase membranaire surexprimée dans :

- **Cancer de la prostate :**
 - formes agressives
 - corrélation avec le Gleason
 - métastatiques hormono-R
- **Néo-vaisseaux des cancers** de vessie, sein, colon, foie, poumon, ovaires, thyroïde et rein
- **Lésions inflammatoires...**

Les différents ligands PSMA en imagerie

Sont-ils interchangeables ?

Captation hépatique
similaire

⁶⁸Ga-PSMA-11

¹⁸F-DCFPyL

¹⁸F-rhPSMA-7

¹⁸F-rhPSMA-1007

Captation hépatique
élevée

Indications du TEP-PSMA dans le Cancer de Prostate

- Bilan initial
- Bilan de la récurrence
- Bilan pré RIV

Stadification initiale des CaP à haut risque

Revue littérature de *Perera et al, 2018* :

- 12 études, dont 5 avec histologie
- Hétérogénéité de méthodologie
- Se : 33-99% et Sp > 90%
- > TDM+ Scinti os

M. Hofman, Peter Mac Callum, PET clin 2017

- Cancer de prostate : Gleason 4+5=9,
 - Bilan d'extension par imagerie conventionnelle (TDM, IRM et scinti os) négatif.
- ^{68}Ga -PSMA TEP/TDM : maladie métastatique
- ➔ Modification de la prise en charge (prostatectomie radicale => hormonothérapie)

ProPSMA diagnostic phase 3 randomised study
Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) PET/CT
 for imaging men with newly diagnosed prostate cancer

302 patients randomised with untreated prostate cancer
10 sites across Australia

50% current method: **CT + Bone scan**
 50% studied method: **PSMA PET/CT**

The data supports PSMA PET/CT imaging as a replacement to current standard-of-care CT and bone scan.

1 A small radioactive molecule is injected into a vein. It finds its way to cancer cells and binds with them.

⁶⁸Ga-PSMA-11

2 The patient then goes into a PET (Positron Emission Tomography) scanner that images the whole body and shows cancerous cells.

3 Patients were then followed for 6 months to determine accuracy.

OTHER FINDINGS:

Research sponsored by: Peter Mac Peter MacCallum Cancer Centre, Victoria Australia
 and proudly funded by: MOMENTUM FOUNDATION Prostate Cancer Foundation of Australia

1/4 N+ ou M+

Hofman *et al*, The Lancet, 2020

1-Stratification initiale des CaP à haut risque

CaP haut risque

- PSA $\geq$ 20 ng/mL
- Score de Gleason $\geq$ 8 (ISUP grade 4 ou 5)
- Stade clinique $\geq$ T2c
 - T2c : T impliquant les 2 lobes de la prostate
 - T3-T4 : extension extracapsulaire ou aux structures adjacentes

TEP PSMA

- Recommandé en 1^{ère} intention car **> TDM et la scintigraphie osseuse (+ Se et + Sp)**
- **Détection** des méta ggl ou os
- Utile pour **adapter la stratégie** thérapeutique : chirurgie, radiothérapie, traitement systémique (impact dans 28 % cas)

1- Stadification initiale des CaP haut risque

- 67 ans
- Bilan d'extension d'un adénocarcinome prostatique ISUP 5 bilatéral
- T3NxMx

=> TEP au Ga-PSMA

Indications du TEP-PSMA dans le Cancer de Prostate

- Bilan initial
- **Bilan de la récurrence**
- Bilan pré RIV

2-Récidive biologique

Reprise évolutive de la maladie détectée uniquement par l'élévation du PSA

- Après prostatectomie :

PSA $\geq$ 0,2 ng/mL, confirmé par une 2^e mesure

- Après radiothérapie externe ou curiethérapie :

Nadir PSA + 2 ng/mL

TEP PSMA

➤ Localisation précoce des foyers tumoraux

2-Récidive biologique cas clinique

- ✓ 63 ans
- ✓ Récidive biochimique d'une néoplasie prostatique initialement classée Gleason 7 (3 + 4) et pT3bpNoMo en mars 2023
- ✓ Prostatectomie puis radiothérapie (PSA post op 0,22 ng/ml => 0,07 ng/ml post Rx)
- ✓ Févr 2025 : PSA 0,34 ng/ml

TEP au PSMA

- Radiopharmaceutique : ^{68}Ga -PSMA-11 ou ^{18}F -DCFPyL (CHU de Bdx)
- Activité : 1,5-2 MBq/Kg
- Réalisation de l'examen :
 - Non à jeun

Radionucléide	demi-vie	désintégration β^+	Emax positon	parcours moyen du positon avant détection	production
Fluor 18	109.8 min	émetteur pur (97%)	635 keV	2.4 mm	cyclotron
Gallium 68	68 min	émetteur impur (88%)	1900 keV	8.2 mm	générateur

- Production industrielle ^{18}F vs
- Générateur : 2 élutions/jour, 1 à 3 doses par élution

Indications du TEP-PSMA dans le Cancer de Prostate

- Bilan initial
- Bilan de la récurrence
- Bilan pré RIV

Ligands du PSMA diagnostique	Ligands marqués au ⁶⁸ Ga	Ligands marqués au ¹⁸ F	
<u>Nom</u>	⁶⁸Ga-PSMA-11 / gozetotide/ Locametz ©	¹⁸ F-DCFPyL / (¹⁸ F) pifufolastat / Pylclari ©	¹⁸ F-PSMA-1007 / Radelumin ©
<u>Laboratoire</u>	Adacap, Novartis	Curium PET France	ABX
<u>Forme</u>	Générateur de Gallium nécessaire dans service de MN	Livré prêt à l'emploi	Livré prêt à l'emploi
<u>Molécule</u>
<u>Biodistribution (MIP)</u>
<u>Indication</u>	AMM 03/2022, commercialisé depuis 07/2023	Autorisation d'AP post AMM 11/2023, commercialisé depuis 05/2024	AMM 12/2021, commercialisé depuis 12/2022
1-Stadification initiale des CaP haut risque	✓	✓	✓
2-Récidive biologique	✓	✓	✓
3-Pré RIV	✓	✗	✗

^{177}Lu -PSMA : Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV): approche théranostique

- **Théranostique** : combinaison de « **Thérapeutique** » + « **Diagnostic** »

Isotope radioactif :

β^+ (^{68}Ga) = TEP PSMA

β^- (^{177}Lu) = RIV (^{177}Lu -PSMA)

TEP-TDM Ga-PSMA

Scinti post Lu-PSMA

Cible : **PSMA**

Vecteur (marqueur tumoral):

ligands du **PSMA**

➔ **Théranostique** : sélection des patients pour un traitement personnalisé

Etude VISION

VISION

RECIST 1.1

	CR	PR	SD	PD
SOC + Lu	9,2 %	41,8 %	35,3 %	13 %
SOC	0 %	3,1 %	46,9 %	45,3 %

PSA50 :

46 % vs
7,1%

PSA80 :

33% vs 2 %

Vision & TheraP : critères de sélection différents

	VISION	TheraP
Examens pré RIV	TEP-TDM au ⁶⁸Ga-PSMA-11 TDM TAP avec injection d'iode	TEP-TDM au ⁶⁸Ga-PSMA-11 TEP-TDM au ¹⁸FDG
Critères d'inclusion	≥1 lésion PSMA > Foie	PSMA SUVmax ≥ 20 SUVmax > 10 a/n autres cibles mesurables
Critères d'exclusion	PSMA – a/n cibles métastatiques identifiés sur le TDM (gg > 2,5 cm, viscéral > 1 cm)	Mismatch FDG+PSMA- exclus

Quelle(s) imagerie(s) TEP dans le bilan pré RIV

TEP au ^{68}Ga -PSMA

= Surexpression du PSMA

- Intensité de fixation
- Visuelle ? organe de référence ?
- SUV max? SUV mean?
- Homogénéité-hétérogénéité tumorale ?

TEP au ^{18}F -FDG ?

= Agressivité tumorale

- Mismatch?
- A faire en systématique ou au cas par cas ?

Utilisation du ^{177}Lu -PSMA-617

Obtention de l'AMM Eu le 09/12/2022 dans l'indication :

- Carcinome prostatique résistant à la castration métastatique
- Évolutif après au moins une ligne de chimiothérapie (docetaxel ou cabazitaxel) et au moins une hormonothérapie de 2nde génération

- Remboursement depuis le 19/04/2023
- Depuis le 24/07/2023, disponible dans le cadre d'un Accès Précoce post-AMM (AP2) jusqu'à la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités
- Depuis le 30/04/2025 : Publication dans le Journal Officiel et commercialisation du Pluvicto®

Sélection des patients éligibles au ^{177}Lu -PSMA

La Tumeur

- Stade de résistance à la castration
- Métastatique
- Progressive
- **Fixation TEP-PSMA homogène et > Foie (>= Glandes salivaires)**

Objectif du traitement

Symptomatique/palliative
Améliorer la qualité de vie
Améliorer la survie/obtenir une réponse réduction PSA

Le patient

- Bon état général (OMS < 2)
- Cl créatinine > 30 ml/mn
- NFS normale
- Absence de lésion osseuse menaçante
- Espérance de vie > 6 mois

Traitements antérieurs

- Lignes antérieures
- 1 hormonothérapie 2de génération et une ligne de chimiothérapie

Efficacité du ^{177}Lu -PSMA-617

- Amélioration des symptômes clinique (douleurs ...)
 - 33 à 66 % des patients
- Amélioration de la qualité de vie
 - 74 % d'amélioration ou de sensibilité des performances ECOG
- Diminution de la concentration de PSA
 - 50 % chez près de la moitié des patients

^{177}Lu -PSMA en MN au CHU de Bordeaux

Autorisation de l'ASN
le 22/03/2023 :
1 traitement/j dans
le service

Début Lu-PSMA au
CHU de Bordeaux
03/04/2023

Ouverture d'un
secteur RIV (6 box)
15/04/2025

30 juin 2021
ATUc

AMM
09/12/2022

Remboursement
19/04/2023

AP post AMM
13/07/2023

Publication au
Journal officiel
30/04/2025

Plan de traitement Lu-PSMA

Parcours patient/HDJ en MN

Depuis juin 2020, ASN : sortie réglementaire possible 6h après l'injection

Effets secondaires du ^{177}Lu -PSMA-617

Clinique

- ✓ Xérostomie
 - ✓ Asthénie
 - ✓ Nausées et troubles digestifs
 - ✓ Exacerbations des douleurs
- ➔ Consultation ou Télécs

Biologique

- ✓ Toxicité médullaire :
Diminutions des globules rouges, blancs et des plaquettes
- ➔ Surveillance du bilan biologique toutes les 3 semaines

PROTOCOLE ^{177}Lu -PSMA

Bilan bio J-7
Examen clinique
HDJ

Scinti post RIV puis sortie

Prémédication
Ondansétron 8 mg
Solupred 40 mg
Hydratation Nacl

Traitement
Début RIV
Administration du
 ^{177}Lu -PSMA

Fin RIV
 ^{177}Lu -PSMA

T-30min

T0

T+30 min

T + 6H

Consignes de
radioprotection

Recueil des urines pendant 6 h post RIV dans cuves dédiées

Rôle de la Médecine Nucléaire dans cancer du pancréas

Conclusion

- Impact de la TEP PSMA sur la prise en charge du cancer de la prostate
 - Patient au stade localisé
 - Patient au stade métastatique
- RIV : nouvelle activité (depuis mars 2023 au CHU de Bdx)
 - Formation des équipes
 - Participation active de toutes les catégories professionnelles
 - Création d'une mailing list (riv-psma.hl@chu-bordeaux.fr)
 - Staff hebdomadaire (toxicité, programmation examen, réservation hôtel...)
 - Echanges avec les oncologues
 - Evolution de l'activité de MN +++ (imagerie + thérapie => attractivité!)
 - Projets émanant des manip : livret patient, ...

MERCI