TEP-IRM cérébrale : quel intérêt en pratique clinique ?

Aurélie KAS

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

APHP Sorbonne Université

Projet TEP-IRM de la Pitié-Salpêtrière

- TEP/IRM 3T SIGNA (GE Healthcare)
- Démarrage en octobre 2015

*PET/MR 3T Signa GE Healthcare
Service de médecine nucléaire GH Pitié-Salpêtrière*

- 50% clinique, 50% recherche
- Activité clinique : 110 examens /mois sur un mi-temps
 - 85% neurologie : neurodégénératif, épilepsie, neuro-oncologie,
 - 15% oncologie : oncologie maxillofaciale, myélome, pelvis

Radioprotection travailleurs

Injected dose : 3 MBq/kg for oncology ; 2 MBq/kg for brain PET/MR

Patient positioning : 8 min for oncology ; 3 min for brain PET/MR

Dosimetry	Dose per patient per technologist (μSv)	Dose per 18F MBq per technologist
All exams (n=1332)	1.3 μSv	10.3 $\pm$ 4 nSv

vs 4–5 μSv for 300 MBq per patient with PET/CT
Leide-Svegborn 2010

Soret et al, 2020

Et la correction d'atténuation ?

$\Delta\text{SUVR PET}_{\text{ZTE}} -3.0 \pm 6.9\%$

Under-estimation

Over-estimation

2.5 5 7.5 10 0 2.5 5 7.5 10

Wollenweber et al., 2013; Wiesinger, et al. 2015 et 2016; Delso, et al. 2015 ; Sekine et al, 2016; Gong et al, 2018, Burgos et al., 2014; Sekine, et al. 2016; Ladefoged et al; 017; Sgard et al 2019 ; Blanc-Durant, PLoS One. 2019

Avantages de la TEP-IRM pour le diagnostic des pathologies cérébrales

Précision diagnostique en TEP

Qualité image TEP comparable à celle de l'HRRT *Mannheim EJNMMI Physics 2021*

IRM : modalité de choix pour l'imagerie du cerveau

Recalage en temps réel et optimal des données TEP et IRM

Intégration en temps réel de la multimodalité

Analyse en temps réel des anomalies métaboliques, structurelles, fonctionnelles

Potentialisée par la lecture en double expertise MN et radiologique

Confort pour le patient :

Schütz L. EJNMI 2016

2 examens de qualité diagnostique en une seule session

La TEP-IRM pour quelles indications ?

Valeur ajoutée d'une TEP/IRM simultanée + double lecture > TEP + IRM séquentiels

- Troubles cognitifs avec co-pathologies : lésions inflam., vasculaires, post-traumatiques
- Syndromes parkinsoniens atypiques (PSP, AMS, DCB)
- Epilepsie partielle pharmaco-résistante : bilan préchirurgical
- Neuro-oncologie : bilan pré-biopsie, récurrence vs. radionécrose

Si, acquisition cérébrale TEP/IRM ≤ 45 min

- 1 seul pas TEP mode list de 20 min (FDG) ; T0 à 30-40 min (FDOPA, FET)
- DIXON + ZTE/UTE, 3DT1 MPRAGE, T2 (coro), FLAIR 3D, diffusion, SWI, ASL, +/- DTI
- Séquences post Gadolinium : perfusion DSC, 3DT1 spin echo fat sat, SRMN

Si, faisabilité et confort du patient assurés

- une TEP/IRM dure 2 à 3 fois plus longtemps qu'un TEP/TDM
- Manque de coopération, mouvements du patient → TEP/TDM cérébral de 10 min
- Claustrophobie, obésité

protocole TEP-FDG/IRM pour l'étude des troubles cognitifs

18FDG : 2 MBq/kg and acquisition 30 p.i.

3DT1

FLAIR

T2*

18F-FDG

DWI

T2*

nigrosome

Qu'apporte la TEP-IRM au diagnostic des maladies neurodégénératives ?

→ Meilleure confiance dans l'évaluation des anomalies corticales en cas d'atrophie

Plaques amyloïdes ?

Gain en précision pour l'analyse des TEP amyloïde

Plaques amyloïdes ?

TEP amyloïde positif

Gain en confort pour les patients and accompagnants (>85%)

*Schütz et al ; Feasibility and acceptance of simultaneous amyloid PET/MRI. 2016
(100 subjects with MCI)*

Qu'apporte la TEP-IRM au diagnostic des maladies neurodégénératives ?

- Meilleure confiance dans l'évaluation de l'hypométabolisme
 - **Evaluation des lésions vasculaires et de leur retentissement**

65 ans
Antécédent d'AVC frontal droit
Trouble de la mémoire
Troubles du langage
Syndrome dysexécutif

**Pathologie vasculaire
+ dégénérescence lobaire frontotemporale ?**

Séquelle d'AVC

Microhémorragies superficielles et profondes

Atrophie hippocampique D>G

**Hypométabolisme de
désafférentation (vasculaire)**

Qu'apporte la TEP-IRM au diagnostic des maladies neurodégénératives ?

- Meilleure confiance dans l'évaluation de l'hypométabolisme
- Evaluation des lésions vasculaires et de leur retentissement
- **Analyse de petites structures**

TEMP

TEPscan

TEP-IRM

Analyse du tronc cérébral et du cortex à l'échelle du gyrus

**Dégénérescence
cortico-basale**

Qu'apporte la TEP-IRM au diagnostic des maladies neurodégénératives ?

- Meilleure confiance dans l'évaluation de l'hypométabolisme
- Evaluation des lésions vasculaires et de leur retentissement
- Analyse de petites structures
- **Synergie TEP et IRM**

IRM complémentaire

Protocole TEP-IRM pour l'épilepsie

18FDG : 2 MBq/kg et acquisition 30 p.i.

Bilan préchirurgical des épilepsies partielles pharmaco-résistantes BUT : Trouver le point de départ de l'épilepsie

Epilepsie partielle pharmaco-résistant
cryptogénique après 2 IRM normales.

Hypométabolisme frontal droit → découverte d'un hypersignal FLAIR
de la SB « en queue de radis » en regard de l'hypométabolisme
→ dysplasie corticale → **lésion épileptogène.**

18F-FDG PET/MR in focal epilepsy: A new step for improving the detection of epileptogenic lesions

Flaus et al 2021

N = 25 EPPR (9 temp, 16 extratemp)

Délai entre TEP : 2.9 ± 2.3 ans (0-10)

IRM = 4 lesions identifiées /25 (3 DCF + 1 SH)

PET/CT + IRM = 8 lesions /25 (+ 3 DCF + 1 mal f Hc)

PET/MR = 14 lesions /25 (+ 6 DCF)

Détection TEP/IRM > fusion TEP/CT + IRM

Impact sur la décision chirurgicale 10/25 (40%)

Importance de pouvoir avoir les 2 examens le même jour

Protocole TEP-IRM en neuro-oncologie

18FDOPA : 2 MBq/kg

PET acquisition starts with tracer injection

Quelles séquences IRM ?

Etude
morphologique
T1, T2 FLAIR
T1 avec et sans
Gado FAT SAT

T1 gado Fatsat

Susceptibilité magnétique

ASL perf sans injection de PdC

Perf T2* après gado rCBV

Anaplastic oligodendroglioma : recurrence vs. radionecrosis

Exhaustive presurgical examination with fMRI or tractography from diffusion tensor imaging

Marner L, Clin Transl Imaging. 2017

Presurgical planning. Sagittal images of a 15-year-old boy with pilocytic astrocytoma (WHO I) in the brain stem. Post-contrast T1 MRI (upper left) showed contrast-enhancing tumor (red arrow) with high metabolic activity on FET PET in the anterior parts of the tumor. Tractography from DTI coregistered to pre-contrast T1 MRI (lower left) showed a close relationship of the corticospinal tract (blue arrow) to the tumor (red arrow). Thus, chemotherapy was decided to be safer than surgery

Conclusions

- Intérêt en clinique : neuro-oncologie > épilepsie > démences
- Examen réalisable en routine clinique
- Attention à la durée des examens
- Plus de confort pour le patient
- Gain en précision diagnostique et niveau de confiance car multimodalité et double expertise de lecture