SESSION 5 - EXPLORATIONS CARDIOLOGIQUES

VIABILITÉ MYOCARDIQUE – ENDOCARDITE EN TEP-TDM AU ^{18}F FDG

Le 06/06/2025

Dr. GONOD Julien
SMNR CH Perpignan

SMNR

Médecine Nucléaire

AFTMN

Association Française
des Techniciens en Médecine Nucléaire

Plan

- ⦿ Métabolisme physiologique cardiaque
- ⦿ Particularité de l'exploration cardiaque
- ⦿ TEP-TDM cardiaque de viabilité au ^{18}F FDG
- ⦿ Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG

Plan

- Métabolisme physiologique cardiaque
- Particularité de l'exploration cardiaque
- TEP-TDM cardiaque de viabilité au ^{18}F FDG
- Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG

Métabolisme physiologique cardiaque

SNC

Cœur

Fixation
médullaire
modérée

Diffuse et
homogène
hépatique et
splénique

Élimination
urinaire

Métabolisme physiologique cardiaque

SNC

Cœur

Fixation
médullaire
modérée

Diffuse et
homogène
hépatique et
splénique

Élimination
urinaire

Métabolisme physiologique cardiaque

SNC

Cœur

Limite :

Hypermétabolisme
physiologique
ventriculaire gauche

Fixation
médullaire
modérée

Diffuse et
homogène
hépatique et
splénique

Élimination
urinaire

Métabolisme physiologique cardiaque

- Voie métabolique du myocarde

Métabolisme physiologique cardiaque

- Voie métabolique du myocarde
 - Acides gras
 - Glucose
 - Lactates
 - Acides Aminés

Métabolisme physiologique cardiaque

- Voie métabolique du myocarde
 - Acides gras (60% des ressources après jeûne 3 à 4 heures)
 - Glucose (70% des ressources après repas)
 - Lactates (60% des ressources au cours effort musculaire)
 - Acides Aminés

Métabolisme physiologique cardiaque

Post prandial
immédiat

Métabolisme physiologique cardiaque

Métabolisme physiologique cardiaque

Tissu
sain

Tissu
sain

Métabolisme physiologique cardiaque

- Si sténose coronaire :

Diminution du débit sanguin

Diminution des apports en nutriments

Diminution des apports en Oxygène

Métabolisme physiologique cardiaque

Tissu sain
Ischémie hibernation

Tissu sain
Ischémie hibernation

Métabolisme physiologique cardiaque

Métabolisme physiologique cardiaque

A Jeûn

Métabolisme physiologique cardiaque

Imagerie du myocarde hibernant

Métabolisme physiologique cardiaque

A Jeûn

A Jeûn + charge glycémique

Métabolisme physiologique cardiaque

A Jeûn

A Jeûn + charge glycémique

Imagerie du myocarde hibernant et normal

Plan

- ⊙ Métabolisme physiologique cardiaque
- ⊙ **Particularité de l'exploration cardiaque**
- ⊙ TEP-TDM cardiaque de viabilité au ^{18}F FDG
- ⊙ Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG

Particularité exploration cardiaque

- Objectif : **Voie Lipidique**
- Dernier repas avant le jeûne :

Aliments autorisés	Aliments interdits
œufs, poulet, poisson (gras de préférence type saumon), toute viande sans moutarde, salade verte avec huile d'olive uniquement (2 cuillères à soupe), SANS PAIN , café ou thé SANS LAIT ou SUCRE , eau pure non sucrée .	TOUT ALIMENT SUCRE , même faiblement, pain, lait, céréales, biscuits/cookies/biscottes, toasts ou viennoiserie, cake, pâtes sous toutes ses formes, riz, féculents (pommes de terre), fruits ou jus de fruits, alcool, bonbons sucrés/chewing-gum, substituts de sucre (incluant Aspartam)

- Jeûne prolongé de 12h avant examen
- Patient Hospitalisé : Pas de perfusion glucosée depuis 12 h, Attention aux médicaments avec excipients sucrés (héparine CHOAY® , antalgiques type Perfalgan® ...), pas d'insuline ++

Plan

- Métabolisme physiologique cardiaque
- Particularité de l'exploration cardiaque
- TEP-TDM cardiaque de viabilité au ^{18}F FDG
- Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG

● Indication :

- Patient insuffisant cardiaque
ET
- Insuffisance cardiaque d'origine coronarienne confirmée ou suspectée

● But :

- Rechercher myocarde viable

Conséquence :

- Indication à revascularisation si au moins 25% VG viable

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG

● Protocole :

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG : histoire d'un cas

$^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG : histoire d'un cas

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG : histoire d'un cas

$^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI

^{18}F FDG

TEP-TDM de viabilité cardiaque au ^{18}F FDG : histoire d'un cas

$^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI

^{18}F FDG

Plan

- Métabolisme physiologique cardiaque
- Particularité de l'exploration cardiaque
- TEP-TDM cardiaque de viabilité au ^{18}F FDG
- Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG

Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG

Endocardite infectieuse :

L'endocardite infectieuse (EI) sur valve native est une pathologie rare mais grave.

Pronostic dépend de la rapidité du diagnostic.

Diagnostic selon critères de Duke modifié, l'échocardiographie conserve une place majeure, mais manque de sensibilité parfois quand les valves sont remaniées. Pour les valves prothétiques, les recommandations de l'ESC 2015 ont ajouté la TEP-TDM au ^{18}F -FDG comme critère majeur d'imagerie.

EI certaine

- **B Critères histologiques** : mise en évidence d'un micro-organisme sur la culture d'une valve ou d'un fragment d'embolo, ou mise en évidence d'une végétation ou d'un abcès avec infection active sur un examen anatomopathologique si la chirurgie a dû être effectuée.

- Critères cliniques :

- 2 critères majeurs

- ou 1 critère majeur et 3 mineurs

- ou 5 critères mineurs

- 1 critère majeur et 1 ou 2 mineurs

- Ou 3 critères mineurs

Absence de critères d'EI certaine et possible. Critères cliniques

Critères cliniques majeurs (2)

- Hémocultures positives pour l'EI

- ≥ 2 hémocultures à micro-organisme typique d'EI (S. aureus, streptocoques oraux, Streptococcus gallolyticus, entérocoques, HACEK)

- Ou ≥ 1 hémoculture positive ou 1 sérologie positive à Coxiella burnetii

- Imagerie positive pour les lésions d'EI

- Échographie cardiaque positive : végétations, abcès, faux anévrisme, fistule, destruction valvulaire, désinsertion de prothèse

- Ou TEP-scan ou scintigraphie aux leucocytes marqués cardiaques positifs : hyperfixation pathologique sur prothèse valvulaire

- Ou scanner cardiaque positif : abcès, faux anévrisme, fistule

Critères cliniques mineurs (5)

- Cardiopathie à risque ou toxicomanie IV

- Fièvre ($T \geq 38^\circ\text{C}$)

- Phénomènes vasculaires (asymptomatiques inclus) : embolies artérielles systémiques ou pulmonaires, anévrismes infectieux (mycotiques), hémorragies, placards de Janeway

- Phénomènes immunologiques : glomérulonéphrite, nodosités d'Osler, taches de Roth, facteurs rhumatoïdes

Argument microbiologique n'entrant pas dans la définition d'un critère majeur : hémocultures, sérologies

EI : endocardite infectieuse ; HACEK : Haemophilus spp., Aggregatibacter

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae ; IV :

intraveineux ; TEP : tomographie par émission de positons.

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG

Indications en TEP :

Endocardite infectieuse

Infection sur boîtier ou sonde de pacemaker

Fièvre d'origine indéterminée / sans point d'appel

Certains germes hypermétaboliques

« Eteindre » l'hypermétabolisme ventriculaire gauche pour mieux voir infection

Intérêt de la TEP :

Diagnostic positif

Porte d'entrée (néoplasie colique, dysplasie bas grade, porte d'entrée dentaire, ...)

Complications (abcès/embol septique, spondylodiscite, ...)

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG

Objectif : **Voie Lipidique**

Dernier repas avant le jeûne :

Aliments autorisés	Aliments interdits
œufs, poulet, poisson (gras de préférence type saumon), toute viande sans moutarde, salade verte avec huile d'olive uniquement (2 cuillères à soupe), SANS PAIN , café ou thé SANS LAIT ou SUCRE , eau pure non sucrée .	TOUT ALIMENT SUCRE , même faiblement, pain, lait, céréales, biscuits/cookies/biscottes, toasts ou viennoiserie, cake, pâtes sous toutes ses formes, riz, féculents (pommes de terre), fruits ou jus de fruits, alcool, bonbons sucrés/chewing-gum, substituts de sucre (incluant Aspartam)

Jeûne prolongé de 12h avant examen

Patient Hospitalisé : Pas de perfusion glucosée depuis 12 h, Attention aux médicaments avec excipients sucrés (héparine CHOAY® , antalgiques type Perfalgan® ...), pas d'insuline ++

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG

Absence d'hypermétabolisme ventriculaire

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (1)

Suspicion d'EI sur
valve biologique
aortique
HAA + à Staph
epidermidis
Porte entrée
suspecte : chirurgie
herniaire

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (1)

Suspicion d'EI sur
valve biologique
aortique
HAA + à Staph
epidermidis
Porte entrée
suspecte : chirurgie
herniaire

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (1)

- Hypermétabolisme :
- Focal et non circonférentiel
 - Persistant sur clichés NAC

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (1)

Complication :
Spondylodiscite T4-T5

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (2)

Bactériémie

Recherche de foyer pouvant étayer une
infection de boitier ou sur sondes

Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (2)

Absence d'hypermétabolisme sur boitier

Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (2)

Absence d'hypermétabolisme sur boitier

Attention piège Diagnostique
artéfact de sur correction sur boitier

Explorations endocardiques au TEP- TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (2)

Explorations endocardiques au TEP-TDM au ^{18}F FDG : histoire d'un cas (2)

Hypermétabolisme focal
suspendu sur sonde
ventriculaire