Standardiser la prise en charge de la douleur en Médecine Nucléaire

quelle stratégie? quels outils?

Jessica Rossignol, manipulatrice radio et référente douleur

Médecine Nucléaire, Hopital Haut Leveque, CHU de Bordeaux

01 Contexte

Douleur sous évaluée en imagerie

Spécificité de la population: patientèle algique (cancer, rhumatisme...) / patients hospitalisés

Examen long, parfois inconfortable: pose de perf, immobilité, bras levés, table en carbone, t°C froide des salles d'examen, transfert, transport...

Contexte anxiogène: notion de radioactivité, peur du résultat, environnement sombre, stress, claustrophobie...

Objectif: Procédure de PEC de la douleur adaptée

02 Pourquoi évaluer?

Appliquer la loi

“Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.”

“Evaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de traitement de la douleur”

La continuité des soins

Améliorer la qualité d'examen

03 les bénéfices d'une démarche standardisée

- ▶▶▶ PEC cohérente et uniforme
- ▶▶▶ Pratiques homogènes dans l'équipe
- ▶▶▶ Organiser le suivi du processus
- ▶▶▶ Gage de sécurité / qualité

04 La stratégie

Avant l'examen

Info douleur sur fiche de l'examen / consignes verbales lors du RDV / phoning /
livret d'accueil pédiatrique

A l'arrivée du patient

Evaluation de la douleur, et si besoin: prescription, administration

Tout au long de l'examen

Surveillance / réévaluation / ajustement

Fin d'examen

Retour d'expérience du patient

05 Les outils

Pour évaluer...

Pour traiter...

Pour traçer...

Echelle Numérique = EN
(En autoévaluation)

Score	Pas de douleur	Douleur faible	Douleur modérée	Douleur intense	Douleur insupportable
0 - 10	0	1 - 3	4 - 5	6 - 7	8 - 10

Prise en charge de la douleur si EN $\geq$ 4/10

Dès 4 ans: Echelle des visages (FPS-R)

0

2

4

6

8

10

Pas mal
du tout

Très
très mal

Prise en charge douleur si score = 3 - 4

Dès 6 ans: Echelle Visuelle Analogique (EVA)

Prise en charge douleur si EN $\geq$ 4/10

RENDEZ-VOUS : TEP n° HMNC14 (UG : 3515) BOX N° :
 Nom : Prénom : Date de naissance :
 Poids : kg Taille :

LIBELLE EXAMEN (Secrétariat) : INJECTION DE 18F-FDG

PREPARATION A L'EXAMEN IDENTITO-VIGILANCE avant l'injection : Nom Prénom DDN
 Manipulateur (trice) responsable : (Questions ouvertes)
 IDENTITO-VIGILANCE à la prise en charge : Nom Prénom DDN
 (Questions ouvertes)

- Jeun > 6h non oui
- Cessation activité physique non oui
- Diabétique non oui
- Si oui, sous insuline Sous Dérivés Metformine
- Glycémie à jeun : mg/dL
- Contraception (si femme en capacité de procréer) : non oui
 Si non, BhCG Négatif Positif réalisé le
- Facteurs de croissance non oui
- Corticoïdes non oui
- Contexte infectieux récent non oui
- Antibiotiques non oui
- Date dernière Chimio :
- Date dernière Radiothérapie :
- Si chirurgie récente, type et date :
- Vaccination récente non oui - Quel bras ?
- Traitement antalgique non oui ; type

Site d'injection MSD MSG
 Utilisation du MEOPA oui non

Etiquette INTEGO
 à coller dans ce cadre sans cacher la phrase de
 vérification d'identito vigilance

EVALUATION DOULEUR AVANT EXAMEN EN : /10
 réalisé par :
 - Ttt proposé au patient : oui non
 - Acceptation : oui non
 Si non, pourquoi ?

EVALUATION DOULEUR APRES EXAMEN EN : /10
 réalisé par :
 - Ttt proposé au patient : oui non
 - Acceptation : oui non
 Si non, pourquoi ?

IMAGERIE Manipulateur (trice) responsable :

Renseignements cliniques :

Acquisition des images		Administration des médicaments	
☐ Bras levés	☐ Bras le long du corps	☐ IV Furosémide 10 mg	
☐ Standard	☐ Corps entier ☐ ORL ☐ Cerveau	☐ IV Furosémide 20 mg	
☐ Reconstruction coupes fines :		☐ IV PDC IODE (1,6ml/kg) si DFG > 30	
☐ Fusion parenchyme ☐ Thorax apnée basse dose		☐	
18F- FDG	18F- Choline	18F- FDopa	68Ga- PSMA
			68Ga- Dotatoc
			Autre (à identifier)

Validation médicale du MRP et du protocole et de la prescription :
 Dr

1 ^{ère} acquisition	Heure début TEP :	Nb de pas :	DLP :mGy.cm	CTDi :mGy
2 ^{ème} acquisition	Heure début TEP :	Nb de pas :	DLP :mGy.cm	CTDi :mGy
Acquisition TDM Thorax :			DLP :mGy.cm	CTDi :mGy

ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS Manipulateur (trice) responsable :

Score avant traitement si douleur	Médicament	Posologie / Volume	Voie Admin.	Lot / Date péremption	Heure d'admin.	Score après traitement si douleur (Rééval à 45 min)

LIBELLE EXAMEN (Secrétariat) : INJECTION DE 18F-FDG

PREPARATION A L'EXAMEN IDENTITO-VIGILANCE avant l'injection : Nom Prénom DDN
 Manipulateur (trice) responsable : (Questions ouvertes)
 IDENTITO-VIGILANCE à la prise en charge : Nom Prénom DDN
 (Questions ouvertes)

- Jeun > 6h non oui
- Cessation activité physique non oui
- Diabétique non oui
- Si oui, sous insuline Sous Dérivés Metformine
- Glycémie à jeun : mg/dL
- Contraception (si femme en capacité de procréer) : non oui
 Si non, BhCG Négatif Positif réalisé le
- Facteurs de croissance non oui
- Corticoïdes non oui
- Contexte infectieux récent non oui
- Antibiotiques non oui
- Date dernière Chimio :
- Date dernière Radiothérapie :
- Si chirurgie récente, type et date :
- Vaccination récente non oui - Quel bras ?
- Traitement antalgique non oui ; type

Etiquette INTEGO
 à coller dans ce cadre sans cacher la phrase de
 vérification d'identito vigilance

EVALUATION DOULEUR AVANT EXAMEN EN : /10
 réalisé par :
 - Ttt proposé au patient : oui non
 - Acceptation : oui non
 Si non, pourquoi ?

EVALUATION DOULEUR APRES EXAMEN EN : /10
 réalisé par :
 - Ttt proposé au patient : oui non
 - Acceptation : oui non
 Si non, pourquoi ?

Feuille de traçabilité TEPSCAN

Documents support

	Entité d'application : SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE / SECTEUR IN VIVO / GROUPE HOSPITALIER SUD	IN-PCP-012
	Emetteur : SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE / SECTEUR IN VIVO / GROUPE HOSPITALIER SUD /	
INSTRUCTION		Ind : 01 Page : 1/2
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR et DE L'INCONFORT EN MEDECINE NUCLEAIRE : PATIENT ADULTE		
Personnes autorisées		
A administrer : médecins A administrer sur prescription médicale : manipulateurs électroradiologie - infirmiers		
Descriptif		
PRESCRIPTION ET ADMINISTRATION DE TRAITEMENT ANTALGIQUE CHEZ LE PATIENT ADULTE		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ APRES VERIFICATION DE L'ABSENCE DE CONTRE-INDICATIONS PAR LE PRESCRIPTEUR ➤ APRES VERIFICATION DES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX PRIS PAR LE PATIENT AVANT L'EXAMEN ➤ EN RESPECTANT LA POSOLOGIE MAXIMALE / 24H ET LES INTERVALLES ENTRE DEUX PRISES ➤ APRES EVALUATION DE LA DOULEUR : EN > 3/10 ou EOC > 3/10 		
I. Patient SANS traitement de fond par OPIOIDES		
A / Patient SANS traitement de fond par paracétamol associé à la codéine ou à l'opium poudre (Lamaline®)		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1ère intention : Associer d'emblée 1cp de tramadol 37,5mg+paracétamol 325mg (ex : Ixprim® 1cp) avec paracétamol 500mg (ex : Dolipranoro 500mg ®) par voie orale ➤ 2ème intention après 60 minutes : Si EN ou EOC > 3/10 Administer 1 ampoule de kétoprofène 100 mg (Profenid® 100 mg) par voie veineuse (à diluer dans 100 ml de NaCl 0.9%, en perfusion lente de 20 minutes minimum) OU si kétoprofène contre-indiqué : 1 ampoule de néfopam 20 mg (Acupan®) par voie sublinguale (sur un sucre de préférence; hors AMM) 		
B / Patient AVEC traitement de fond par paracétamol associé à la codéine ou à l'opium poudre (Lamaline®)		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1ère intention : Reprise du traitement antalgique habituel du patient ➤ 2ème intention après 60 minutes : Si EN ou EOC > 3/10 Administer 1 ampoule de kétoprofène 100 mg (Profenid® 100 mg) par voie veineuse (à diluer dans 100 ml de NaCl 0.9%, en perfusion lente de 20 minutes minimum) OU si kétoprofène contre-indiqué : 1 ampoule de néfopam 20 mg (Acupan®) par voie sublinguale (sur un sucre de préférence; hors AMM) 		

	Entité d'application : SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE / SECTEUR IN VIVO / GROUPE HOSPITALIER SUD	IN-PCP-013
	Emetteur : SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE / SECTEUR IN VIVO / GROUPE HOSPITALIER SUD /	
INSTRUCTION		Ind : 01 Page : 1/2
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR et DE L'INCONFORT EN MEDECINE NUCLEAIRE : ENFANT ET ADOLESCENT		
Personnes autorisées		
A administrer : médecins A administrer sur prescription médicale : manipulateurs électroradiologie - infirmiers		
Descriptif		
PRESCRIPTION ET ADMINISTRATION DE TRAITEMENT ANTALGIQUE CHEZ LE PATIENT DE 0 A 15 ANS		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ APRES VERIFICATION DE L'ABSENCE DE CONTRE-INDICATIONS PAR LE PRESCRIPTEUR ➤ APRES VERIFICATION DES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX PRIS PAR LE PATIENT AVANT L'EXAMEN ➤ EN RESPECTANT LA POSOLOGIE MAXIMALE / 24H ET LES INTERVALLES ENTRE DEUX PRISES ➤ APRES EVALUATION DE LA DOULEUR : <ul style="list-style-type: none"> ○ EVA pédiatrique > 3/10 ou EN (à partir de 12 ans) > 3/10 ○ ou FLACC > 3/10 (pour les moins de 6 ans) 		
1. Patient SANS traitement de fond par OPIOIDES		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1ère intention : Associer d'emblée ibuprofène (10mg/kg/8h) et paracétamol (1ère prise : 20mg/kg/6h puis 15mg/kg/6h pour les prises ultérieures) par voie orale ➤ 2ème intention après 60 minutes : Si EVA ou EN ou FLACC > 3/10 Administer à partir de 3 ans du tramadol 100mg/ml (solution buvable) 4 gouttes/10 kg (x4/jour) par voie orale 		
2. Patient AVEC un traitement de fond par OPIOIDES		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reprise du traitement opioïde habituel à Libération Immédiate ET associer en systématique de l'ibuprofène (10mg/kg/8h) par voie orale OU si ibuprofène contre-indiqué associer du paracétamol (1ère prise : 20mg/kg/6h) par voie orale 		

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT	
INCONFORT ET DOULEUR DU PATIENT : MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS DISPONIBLES DANS LE SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE	
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR et DE L'INCONFORT DES PATIENTS Médicaments à disposition dans le service	
ADULTES	ENFANTS
VOIE ORALE :	VOIE ORALE :
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Paracétamol (Dolipranoro 500 mg®) lyophilisat oral ➤ Paracétamol 1000 mg comprimés ➤ Nefopam 20 mg (Acupan®) solution injectable à administrer par voie sublinguale exclusivement dans le service d'imagerie (sur un sucre de préférence; hors AMM) ➤ Paracétamol codéiné (Dafalgan codéiné®) 500mg/30mg comprimés ➤ Lamaline® gélules ➤ Association tramadol/paracétamol 37.5 mg/325 mg (Ixprim®) comprimés 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Paracétamol (Doliprane®) 100 mg, 150 mg, 200 mg, 500 mg poudre pour suspension buvable ➤ Tramadol (Topalgic®) 100 mg/ml solution buvable en flacon compte-gouttes ➤ Ibuprofène 20 mg/ml suspension buvable ➤ Ibuprofène 200 mg et 400 mg comprimés
VOIE INJECTABLE :	
➤ Kétoprofène 100 mg (Profenid®) injectable	
OPIOIDES SITUES DANS LE COFFRE A TOXIQUES NB : Posologie fonction de l'âge et du poids du patient	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulfate de morphine à Libération Immédiate (LI) : Actiskenan® 5 mg, 10 mg, gélules - Oramorph® 10mg/5ml solution buvable en récipients unidoses ➤ Chlorhydrate d'oxycodone LI : Oxynormo® 5 mg et 10 mg comprimés orodispersibles 	
AUTRES MOYENS	
ADULTES	ENFANTS
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Phloroglucinol 80 mg (Spasfon Iyoc®) lyophilisat oral ❖ Métopimazine 7.5 mg (Vogalène®) lyophilisat oral ❖ Emla® patch 5% pansement adhésif (enfant à partir de 1 an) ❖ Atarax® 25mg comprimé ou forme sirop (chez l'enfant) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Coussins thermiques ❖ Gélose, coussins de positionnement ❖ Matelas de transfert, lève patient

Antalgiques

Dispositifs de confort

Environnement / Gestion du stress

Aromathérapie

Musique dans
la salle
d'examen

Kitten scan
pour
les enfants

Plafond lumineux

MEOPA

07

Limites et réalité du terrain

changement habitude

manque de temps

manque de personnel

subjectivité de la douleur

croyances du patient

08 Indicateurs de réussite

87%

**des patients
sont
évalués à
leur arrivée**

15/20

**des manip
évaluent
leurs
patients à
plus de 80%**

86%

**des manip
déclarent
être à l'aise
avec cette
PEC de la
douleur**

98%

**des patients
(très)
satisfaits
de la PEC
de leur
douleur**

09 Amélioration continue

Aménagement de l'environnement

Renouvellement dispositifs confort

Renouvellement TEPSCAN / acquisition plus rapide

Approche non médicamenteuse

Intégration d'un médecin référent

Traçabilité sur le dossier informatique du patient

Resensibilisation du personnel / formation +++

Evaluation
standardisée
=
PEC optimale

Standardisation
≠
Ecoute & empathie

Evaluation systématique
et structurée
=
Approche homogène de la
douleur

Merci!

Contact: jessica.rossignol@chu-bordeaux.fr