

Protocolo para resección neoplásica de cáncer de labio y cavidad oral:

Informe basado en CAP vigente; AJCC 9º ed.:

- Procedimiento: tumorectomía. / glosectomía. / mandibulectomía. / + vaciamiento cervical funcional derecho/izquierdo.
- Focalidad tumoral: unifocal. / multifocal.
- Localización tumoral:
- Lateralidad: derecha. / izquierda. / línea media.
- Tamaño tumoral:
 - * Diámetro mayor: cm.
 - * Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: carcinoma escamoso convencional, queratinizante. / no queratinizante. / basaloide. / adenoescamoso. / papilar.
- Grado histológico: G1 (bien diferenciado). / G2 (moderadamente diferenciado). / G3: (pobremente diferenciado).
- Profundidad de infiltración (DOI): mm.
- Extensión tumoral: la lesión infiltra (especificar estructuras).
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente (linfática / venosa / arterial).
- Invasión perineural: no se observa. / presente (intratumoral / extratumoral / intraneural).
- WPOI (peor patrón de infiltración):
 - * WPOI 1-4:
 - * WPOI 5 (> o= 1 mm de dispersión entre tumor y satélites).
- Márgenes quirúrgicos:
 - * Margen anterior: a mm de margen teñido.
 - * Margen posterior: a mm de margen teñido.
 - * Margen superior / 12 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen inferior / 6 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen lateral / 9 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen medial / 3 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen profundo: a mm de margen teñido.
- Estatus ganglionar linfático:
 - * Lateralidad: ipsilateral. / contralateral. / bilateral.
 - * Tercio superior: (/).
 - * Tercio medio: (/).
 - * Tercio inferior: (/).
 - * Diámetro de la metástasis de mayor tamaño: mm.
 - * Extensión extranodal (distancia desde la cápsula):
 - >2 mm (ENE macroscópico).
 - <2 mm (ENE microscópico).
- Otros hallazgos:
 - *
- Estudio IHQ:
 - * Positividad para
 - * Negatividad para

*** Clasificación TNM (AJCC 9º Ed): pT pN (/).

*pTis: Carcinoma *in situ**

pT1: Tumor less than or equal to 2 cm with depth of invasion (DOI) less than or equal to 5 mm

pT2: Tumor less than or equal to 2 cm with DOI greater than 5 mm or tumor greater than 2 cm and less than or equal to 4 cm with DOI less than or equal to 10 mm

pT3: Tumor greater than 2 cm and less than or equal to 4 cm with DOI greater than 10 mm or tumor greater than 4 cm with DOI less than or equal to 10 mm

pT4a: Moderately advanced local disease. Tumor greater than 4 cm with DOI greater than 10 mm or tumor invades adjacent structures only (e.g., through cortical bone of the mandible or maxilla or involves the maxillary sinus or skin of the face)

pT4b: Very advanced local disease. Tumor invades masticator space, pterygoid plates, or skull base, and / or encases internal carotid artery

pT4 (subgroup cannot be determined)

pN not assigned (no nodes submitted or found)

pN not assigned (cannot be determined based on available pathological information)

pN0: No regional lymph node metastasis

pN1: Metastasis in a single ipsilateral lymph node, 3 cm or smaller in greatest dimension and ENE(-)

pN2a: Metastasis in single ipsilateral node 3 cm or smaller in greatest dimension and ENE(+); or a single ipsilateral node larger than 3 cm but not larger than 6 cm in greatest dimension and ENE(-)

pN2b: Metastases in multiple ipsilateral nodes, none larger than 6 cm in greatest dimension and ENE(-)

pN2c: Metastases in bilateral or contralateral lymph node(s), none larger than 6 cm in greatest dimension and ENE(-)

pN3a: Metastasis in a lymph node larger than 6 cm in greatest dimension and ENE(-)

pN3b: Metastasis in a single ipsilateral node larger than 3 cm in greatest dimension and ENE(+); or multiple ipsilateral, contralateral or bilateral nodes any with ENE(+); or a single contralateral node of any size and ENE(+)