

## Protocolo para resección neoplásica de cáncer de melanoma de mucosas:

Informe basado en CAP vigente; AJCC 9º ed.:

- Antecedentes clínicos: cirugía. / quimioterapia. / radioterapia.
- Procedimiento: tumorectomía. / glosectomía. / mandibulectomía. / + vaciamiento cervical funcional derecho/izquierdo.
- Focalidad tumoral: unifocal. / multifocal.
- Localización tumoral:
- Lateralidad: derecha. / izquierda. / línea media.
- Tamaño tumoral:
  - \* Diámetro mayor: cm.
  - \* Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: melanoma invasivo desmoplásico. / lentiginoso. / nodular.
- Grado histológico: G1 (bien diferenciado). / G2 (moderadamente diferenciado). / G3: (pobremente diferenciado).
- Necrosis: presente. / ausente.
- Extensión tumoral: lesión limitada a mucosa. / submucosa. / lesión infiltra partes blandas. / músculo. / cartílago. / hueso. / piel suprayacente. / tejido nervioso. / arteria carótida.
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente (linfática / venosa / arterial).
- Invasión perineural: no se observa. / presente (intratumoral / extratumoral / intraneural).
- Márgenes quirúrgicos:
  - \* Componente "in situ":
    - Margen anterior: a mm de margen teñido.
    - Margen posterior: a mm de margen teñido.
    - Margen superior / 12 h: a mm de margen teñido.
    - Margen inferior / 6 h: a mm de margen teñido.
    - Margen lateral / 9 h: a mm de margen teñido.
  - \* Componente "infiltrante":
    - Margen anterior: a mm de margen teñido.
    - Margen posterior: a mm de margen teñido.
    - Margen superior / 12 h: a mm de margen teñido.
    - Margen inferior / 6 h: a mm de margen teñido.
    - Margen lateral / 9 h: a mm de margen teñido.
    - Margen medial / 3 h: a mm de margen teñido.
    - Margen profundo: a mm de margen teñido.
- Estatus ganglionar linfático:
  - \* 1er Ganglio centinela: (/).
  - \* 2do Ganglio centinela: (/).
  - \* 3er Ganglio centinela: (/).
  - \* Vaciamiento funcional: ipsilateral. / contralateral. / bilateral.
    - Tercio superior: (/).
    - Tercio medio: (/).
    - Tercio inferior: (/).
  - \* Diámetro de la metástasis de mayor tamaño: mm.
  - \* Extensión extranodal (distancia desde la cápsula):
    - >2 mm (ENE macroscópico).
    - <2 mm (ENE microscópico).
- Otros hallazgos:
  - \*
- Estudio IHQ:
  - \* Positividad para
  - \* Negatividad para

\*\*\* Clasificación TNM (AJCC 9º Ed): pT pN (/).

<https://documents.cap.org/protocols/HN.MucosalMelanoma.Res.1.1.0.0.REL.CAPCP.pdf>

*pTis: Carcinoma \*in situ\**

*pT3: Tumors limited to the mucosa and immediately underlying soft tissue, regardless of thickness or greatest dimension; for example, polypoid nasal disease, pigmented or nonpigmented lesions of the oral cavity, pharynx, or larynx*

*pT4: Moderately advanced or very advanced*

*pT4a: Moderately advanced disease. Tumor involving deep soft tissue, cartilage, bone, or overlying skin*

*pT4b: Very advanced disease. Tumor involving brain, dura, skull base, lower cranial nerves (IX, X, XI, XII), masticator space, carotid artery, prevertebral space, or mediastinal structures*

*pN not assigned (no nodes submitted or found)*

*pN0: No regional lymph node metastases*

*pN1: Regional lymph node metastases present*