

## Pieza de resección neoplásica de nasofaringe:

Informe basado en CAP vigente, AJCC/UICC 9th ed.:

- Procedimiento: escisión.
- Localización tumoral: pared superior. / posterior. / anterior. / lateral (fosa de Rosenmüller). / adenoides.
- Lateralidad: izquierda. / derecha. / línea media. / bilateral.
- Tamaño tumoral:
  - \* Diámetro mayor: cm.
  - \* Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: carcinoma escamoso queratinizante, NOS. / no queratinizante, NOS. / basaloide. / adenocarcinoma nasofaríngeo papilar de bajo grado. / tumor neuroendocrino, grado 1. / 2. / 3. / carcinoma neuroendocrino de célula pequeña / grande.
- Grado histológico (carcinoma escamoso): G1 (bien diferenciado). / G2 (moderadamente diferenciado). / G3: (pobremente diferenciado). / G4 (indiferenciado).
- Extensión tumoral: infiltra X estructuras.
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente (linfática / venosa / arterial).
- Invasión perineural: no se observa. / presente.
- Márgenes quirúrgicos:
  - \* Margen anterior: a mm de margen teñido.
  - \* Margen posterior: a mm de margen teñido.
  - \* Margen superior / 12 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen inferior / 6 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen lateral / 9 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen medial / 3 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen profundo / 3 h: a mm de margen teñido.
- Estatus ganglionar linfático:
  - \* Lateralidad: ipsilateral. / contralateral. / bilateral.
  - \* Tercio superior: (/).
  - \* Tercio medio: (/).
  - \* Tercio inferior: (/).
  - \* Diámetro de la metástasis de mayor tamaño: mm.
  - \* Extensión extranodal (distancia desde la cápsula):
    - >2 mm (ENE macroscópico).
    - <2 mm (ENE microscópico).
- Otros hallazgos:
  - \*
- Estudio IHQ:
  - \* Positividad para
  - \* Negatividad para
- Estudio complementarios:
  - \* IHQ para p16: negativo (<50% de tinción nuclear y citoplasmática de intensidad moderada a intensa). / equívoco (entre el 50% y el 69% de tinción nuclear y citoplasmática de intensidad moderada a intensa). / positivo (≥70% de tinción nuclear y citoplasmática de intensidad moderada a intensa).
  - \* Hibridación “in situ” para VPH (HPV ISH): negativo (ausencia de señal). / positivo (señal citoplasmática y/o nuclear).
    - Subtipo viral: .
  - \* PCR para ADN de VPH: negativo. / positivo.
    - Subtipo viral: .

\* Virus de Epstein-Barr (VEB ISH): negativo (ausencia de señal nuclear). / positivo (presencia de señal nuclear).

\*\*\* Estadio TNM (AJCC 9º Ed): pT pN (/).

[https://documents.cap.org/protocols/HN.Nasopharynx.Res.1.0.0.0.REL\\_CAPCP.pdf](https://documents.cap.org/protocols/HN.Nasopharynx.Res.1.0.0.0.REL_CAPCP.pdf)

*pT Category*

*pT1: Tumor confined to nasopharynx; OR Tumor with extension to any of the following without parapharyngeal involvement: oropharynx or nasal cavity*

*pT2: Tumor with extension to any of the following: Parapharyngeal space; or adjacent soft tissue involvement of medial pterygoid, lateral pterygoid, prevertebral muscles*

*pT3: Tumor with unequivocal infiltration into any of the following bony structures: Skull base (including pterygoid structures); or paranasal sinuses; or cervical vertebrae*

*pT4: Tumor with any of the following: Intracranial extension; or unequivocal radiological and / or clinical involvement of cranial nerves; or involvement of hypopharynx; or involvement of orbit (including inferior orbital fissure); or involvement of parotid gland; or extensive soft tissue infiltration beyond the anterolateral surface of the lateral pterygoid*

*pN Category*

*pN0: No tumor involvement of regional lymph node(s)*

*pN1: Tumor involvement of any of the following: Unilateral cervical lymph node(s) or unilateral or bilateral retropharyngeal lymph node(s); AND all of the following: Less than or equal to 6 cm in greatest dimension; and above the caudal border of cricoid cartilage; and without advanced extranodal extensión*

*pN2: Tumor involvement of bilateral cervical lymph nodes AND all of the following: Less than or equal to 6 cm in greatest dimension; and above the caudal border of cricoid cartilage; and without advanced extranodal extensión*

*pN3: Tumor involvement of unilateral or bilateral cervical lymph node(s); AND any of the following: Greater than 6 cm in greatest dimension; or extension below the caudal border of cricoid cartilage; or advanced radiologic extranodal extensión with involvement of adjacent muscles, skin, and / or neurovascular bundle*