

## Resección neoplásica de próstata:

Informe basado en CAP vigente y AJCC/TNM, 8ª ed.:

- Procedimiento: prostatectomía radical.

- Próstata:

\* Peso: g.

\* Tamaño: cm.

- Tipo histológico: adenocarcinoma acinar (convencional / con anillo de sello / sarcomatoide / pleomórfico de células gigantes). / ductal. / neuroendocrino de próstata.

- Grado de Gleason:

grado 1 (Gleason Score 3 + 3 = 6).

grado 2 (Gleason Score 3 + 4 = 7).

grado 3 (Gleason Score 4 + 3 = 7).

grado 4 (Gleason Score 4 + 4 = 8). / (Gleason Score 3 + 5 = 8). / (Gleason Score 5 + 3 = 8).

grado 5 (Gleason Score 4 + 5 = 9). / (Gleason Score 5 + 4 = 9). / (Gleason Score 5 + 5 = 10).

\* Porcentaje de patrón 4: %.

\* Porcentaje de patrón 5: %

- Carcinoma intraductal (IDC): presente. / no se identifica.

- Glándulas cribiformes: presente. / no identificado (aplicable si Gleason 7 u 8).

- Efecto del tratamiento: no identificado. / efecto de la radioterapia presente. / efecto de la hormonoterapia presente.

- Cuantificación tumoral: cc.

- Volumen de la próstata afectado por tumor: <1 %. / 1-5%. /6-10%. /11-20%. / 21-30%. /31-40%. / 41-50%.

- Extensión extraprostática: no identificada. / presente, focal. / presente y extensa. / de localización X.

- Afectación del cuello vesical: presente. / no identificado.

- Afectación de vesículas seminales: no identificado. / presente, izquierda. / presente, derecha.

- Invasión linfovascular: no identificada. / presente.

- Invasión perineural: no identificada. / presente.

- Márgenes quirúrgicos: libres. / en contacto en localización X.

\* Grado de Gleason en el margen afecto: grado 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ( + = ).

- Márgenes glandulares: libre. / en contacto en localización X.

- Ganglios linfáticos regionales:

\* Ganglios linfáticos aislados: .

\* Ganglios linfáticos metastatizados: (/).

- Hallazgos adicionales:

\* Proliferación intraductal atípica (AIP).

\* Neoplasia intraepitelial de alto grado (PIN).

\* Hiperplasia atípica adenomatosa.

\* Hiperplasia benigna de próstata:

\*\*\* Estadio TNM (AJCC 8º Ed): pT pN (/).

[https://documents.cap.org/protocols/Prostate\\_4.3.0.0.REL\\_CAPCP.pdf?\\_gl=1\\*1wyjwnq\\*\\_ga\\*MTM4MTMxNDM5Mi4xNzE3NDQwOTIx\\*\\_ga\\_97ZFJSQQ0X\\*MTcxNzQ0MDkyMC4xLjEuMTcxNzQ0MjQwMi4wLjAuMA](https://documents.cap.org/protocols/Prostate_4.3.0.0.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*1wyjwnq*_ga*MTM4MTMxNDM5Mi4xNzE3NDQwOTIx*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNzQ0MDkyMC4xLjEuMTcxNzQ0MjQwMi4wLjAuMA)

*pT2: Organ confined*

*pT3a: Extraprostatic extension or microscopic invasion of bladder neck*

*pT3b: Tumor invades seminal vesicle(s)*

*pT4: Tumor is fixed or invades adjacent structures other than seminal vesicles such as external sphincter, rectum, bladder, levator muscles, and / or pelvic wall*

*pN0: No positive regional nodes*

*pN1: Metastasis in regional nodes*