

## Resección neoplásica de mama izquierda / derecha:

Informe basado en CAP vigente, AJCC/UICC TNM 8ª ed.:

- Procedimiento: excisión. / cirugía conservadora de mama. / mastectomía ahorradora de piel y de complejo areola-pezón. / mastectomía radical.
- Lateralidad: derecha. / izquierda.
- Localización: retroareolar. / cuadrante súperoexterno. / cuadrante súperointerno. / cuadrante ínferointerno. / cuadrante ínferoexterno. / central. / retroareolar.
- Tamaño tumoral:
  - \* Diámetro mayor: cm.
  - \* Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: tumor filodes benigno. / borderline. / maligno.
- Celularidad estromal: leve (sin solapamiento nuclear estromal). / moderado (leve solapamiento nuclear estromal). / severo (marcado solapamiento nuclear estromal).
- Atipia estromal:
  - \* No se observa.
  - \* Leve (*minimal variation in nuclear size, even chromatin, and smooth nuclear contours*).
  - \* Moderada (*more variation in nuclear size and irregular nuclear membranes*).
  - \* Severa (*marked nuclear pleomorphism, hyperchromasia, and irregular nuclear contours*).
- Sobrecrecimiento estromal:
  - \* Ausente.
  - \* Presente (*Stromal overgrowth is present when there is at least one low-power microscopic field (4x objective and 10x eyepiece or 22.9 mm<sup>2</sup>) that contains stroma only without epithelial elements*).
- Ratio mitótico: X mitosis en 10xCGA. / X mitosis / mm<sup>2</sup>.
- Borde histológico tumoral: circunscrito (bien delimitado). / infiltrativo (focal / extenso).
- Elementos malignos atípicos: no identificado. / focos de liposarcoma. / focos de osteosarcoma. / focos de condrosarcoma.
- Márgenes quirúrgicos:
  - \* Margen anterior: a mm de margen teñido.
  - \* Margen posterior: a mm de margen teñido.
  - \* Margen 12 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen 6 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen 9 h: a mm de margen teñido.
  - \* Margen 3 h: a mm de margen teñido.
- Ganglios linfáticos regionales: (/) (sn).
- Otros hallazgos histológicos:
  - \* Cambios fibroquísticos de la mama proliferativos sin atipia (hiperplasia intraductal usual, adenosis esclerosante, papiloma intraductal, cicatriz radial, fibroadenoma).
  - \* Cambios fibroquísticos de la mama no proliferativos (fibrosis, dilatación quística ductal, adenosis, metaplasia apocrina, cambios de células columnares).
  - \* Cambios asociados a biopsia previa (fibrosis, necrosis grasa).

\*\*Clasificación TNM (8ª edición): pT ( mm) pN (/ sn , / no sn)

[https://documents.cap.org/protocols/Breast.Phyllodes.1.1.0.1.REL.CAPCP.pdf?\\_gl=1\\*\\_rj1knf\\*\\_ga\\*MjA2MDA1NzI5Mi4xNzE2ODM1Mzlw\\*\\_ga\\_97ZFJSQ0X\\*MTcxNjgzNTMxOS4xLjEuMTcxNjgzNTgzOC4wLjAuMA](https://documents.cap.org/protocols/Breast.Phyllodes.1.1.0.1.REL.CAPCP.pdf?_gl=1*_rj1knf*_ga*MjA2MDA1NzI5Mi4xNzE2ODM1Mzlw*_ga_97ZFJSQ0X*MTcxNjgzNTMxOS4xLjEuMTcxNjgzNTgzOC4wLjAuMA)

*pT0: No evidence of primary tumor*

*pT1: Tumor 5 cm or less in greatest dimension*

*pT2: Tumor more than 5 cm but not more than 10 cm*

*pT3: Tumor more than 10 cm but not more than 15 cm*

*pT4: Tumor more than 15 cm in greatest dimension*

*pN0: No regional lymph node metastasis*

*pN1: Regional lymph node metastasis*