

Resección neoplásica de tumor trofoblástico:

Informe basado en CAP vigente, AJCC/UICC TNM, 8ª ed.:

- Procedimiento: dilatación y curetaje. / histerectomía simple. / histerectomía supracervical. / histerectomía radical. / exanteración pélvica.
- Tipo de cirugía: abdominal. / vaginal. / laparoscópica.
- Integridad del espécimen: intacta. / rasgada. / abierta. / morcelación del tejido.
- Localización: cuerpo / cérvix uterino. / otro (especificar).
- Tamaño:
 - * Dimensión mayor: cm.
 - * Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: mola hidatiforme (invasiva). / coriocarcinoma NOS. / tumor trofoblástico del lecho placentario. / tumor trofoblástico (maligno / epitelioides).
- Extensión a órganos: ovario izquierdo / derecho. / trompa de Falopio derecha. / izquierda. / ligamento redondo. / vagina. / otros órganos (especificar).
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente.
- Márgenes quirúrgicos:
 - * Margen proximal: libre de infiltración neoplásica. / en contacto
 - * Margen distal: libre de infiltración neoplásica. / en contacto.
 - * Margen radial: rectal / vaginal etc.): libre de infiltración neoplásica. / en contacto.
 - * Margen ectocervical: libre de infiltración neoplásica. / en contacto
 - * Margen parametrial: libre de infiltración neoplásica. / en contacto.
 - * Margen (otros: rectal / vaginal etc.): libre de infiltración neoplásica. / en contacto.
- Ganglios linfáticos regionales:
 - * Ganglios aislados:
 - * Ganglios metastatizados:
- Metástasis a distancia: no presente. / presente (pulmón / bazo / riñón / tracto gastrointestinal / hígado / cerebro).
- Número de focos metastásicos: de 1 a 4. / de 5 a 8. / > 8.
- Otros hallazgos:
 - * Anejo derecho: Quistes de inclusión en ovario derecho. / quistes paratubáricos en trompa.
 - * Anejo izquierdo: Quistes de inclusión en ovario derecho. / quistes paratubáricos en trompa.
 - * Cérvix: Quistes de Naboth en cuello uterino, metaplasia escamosa endocervical.
 - * Cuerpo uterino: endometrio atrófico-quístico. / útero polimiomatoso.

***Clasificación patológica TNM (8ª edición): pT pN (0/)

***Estadio FIGO:

https://documents.cap.org/protocols/Trophoblast_4.1.0.1.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*h1hy36*_ga*MTAyNzA1MjUxOC4xNzE3MDAzMDU5*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNzAwMzA1OC4xLjEuMTcxNzAwMzEwNy4wLjAuMA

pT not assigned (cannot be determined based on available pathological information)

pT0: No evidence of primary tumor

pT1: Tumor confined to uterus

pT2: Tumor extends to other genital structures (ovary, tube, vagina, broad ligaments) by metastasis or direct extension pM Category

pM1a: Lung metastasis

pM1b: All other distant metastasis

FIGO Stage (2018 FIGO Cancer Report)

I: Disease confined to the uterus

II: Gestational trophoblastic tumor extends outside of the uterus, but limited to the genital structures (adnexa, vagina, broad ligament)

III: Gestational trophoblastic tumor extends to the lungs, with or without known genital tract involvement

IV: All other metastatic sites