

## Protocolo para adenocarcinoma de útero:

Informe basado en CAP vigente, AJCC/UICC TNM, 8ª ed.:

- Historia clínica: síndrome de Lynch. / otros.
- Procedimiento: traquelectomía. / histerectomía total más doble anexectomía / salpinguectomía. / histerectomía radical / simple. / salpinguectomía / anexectomía derecha. / izquierda.
- Tipo de cirugía: abdominal. / vaginal. / laparoscópica.
- Integridad del espécimen: intacta. / rasgada. / abierta. / morcelación del tejido.
- Tamaño:
  - \* Dimensión mayor: cm.
  - \* Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: carcinoma endometriode (NOS / POLE-mutado / asociado a inestabilidad de microsátélites / p53 mutado). / carcinoma seroso. / carcinoma mucinoso. / de células claras.
- Grado histológico: grado 1 / 2 / 3 de la FIGO.
  - \* *Only officially designated for endometrioid and mucinous carcinomas. Severe cytologic atypia in the majority of cells (> 50%), increases the tumor grade by 1. squamous component of endometrioid adenocarcinoma should not be graded.*
  - \* *Grade 1: 5% or less non-squamous solid growth pattern*
  - \* *Grade 2: 6% to 50% non-squamous solid growth pattern*
  - \* *Grade 3: >50% non-squamous solid growth pattern*
- Invasión miometrial: menor / mayor del 50% del espesor miometrial.
  - \* Profundidad: mm.
  - \* Espesor miometrial: mm.
- Adenomiosis: no se observa. / presente (afectada / no afectada por carcinoma).
- Infiltración de la serosa: no se observa. / presente y focal (<5 vasos). / y extensa (>5 vasos).
- Afectación de segmento uterino inferior: no se observa. / presente y superficial (no infiltra miometrio). / presente, infiltrando miometrio.
- Afectación del estroma cervical: no se observa. / presente, de X mm.
- Extensión a otros órganos: anejo izquierdo / derecho. / mucosa rectal. / mucosa vesical. / otros órganos (especificar).
- Citología peritoneal / líquido ascítico ( ):
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente.
- Márgenes quirúrgicos:
  - \* Margen ectocervical: libre de infiltración neoplásica. / en contacto
  - \* Margen parametrial: libre de infiltración neoplásica. / en contacto.
  - \* Margen (otros: rectal / vaginal, etc.): libre de infiltración neoplásica. / en contacto.
- Otros hallazgos:
  - \* Anejo derecho: Quistes de inclusión en ovario derecho. / quistes paratubáricos en trompa.
  - \* Anejo izquierdo: Quistes de inclusión en ovario derecho. / quistes paratubáricos en trompa.
  - \* Cérvix: Quistes de Naboth en cuello uterino, metaplasia escamosa endocervical.
  - \* Cuerpo uterino: endometrio atrófico-quístico. / útero polimiomatoso.

\*\*\*Clasificación patológica TNM (8ª edición): pT pN (0/)

\*\*\*Estadio FIGO:

*pT1a: Tumor limited to endometrium or invading less than half the myometrium*

*pT1b: Tumor invading one half or more of the myometrium*

*pT2: Tumor invading the stromal connective tissue of the cervix but not extending beyond the uterus. Does NOT include only endocervical glandular involvement.*

*pT3a: Tumor involving serosa and / or adnexa (direct extension or metastasis)*

*pT3b: Vaginal involvement (direct extension or metastasis) or parametrial involvement*

*pT4: Tumor invading bladder mucosa and / or bowel mucosa (bullous edema is not sufficient to classify a tumor as T4)*

*pN0: No regional lymph node metastasis*

*pN0(i+): Isolated tumor cells in regional lymph node(s) no greater than 0.2 mm*

*pN1mi: Regional lymph node metastasis (greater than 0.2 mm but not greater than 2.0 mm in diameter) to pelvic lymph nodes*

*pN1a: Regional lymph node metastasis (greater than 2.0 mm in diameter) to pelvic lymph nodes*

*pN2mi: Regional lymph node metastasis (greater than 0.2 mm but not greater than 2.0 mm in diameter) to para-aortic lymph nodes, with or without positive pelvic lymph nodes#*

*pN2a: Regional lymph node metastasis (greater than 2.0 mm in diameter) to para-aortic lymph nodes, with or without positive pelvic lymph nodes*

*+FIGO Stage (2018 FIGO Cancer Report)*

*IA: No or less than half myometrial invasion*

*IB: Invasion equal to or more than half of the myometrium*

*II: Tumor invades cervical stroma, but does not extend beyond the uterus*

*IIIA: Tumor invades the serosa of the corpus uteri and / or adnexae*

*IIIB: Vaginal and / or parametrial involvement*

*IIIC: Metastases to pelvic and / or para-aortic lymph nodes*

*IIIC1: Positive pelvic nodes*

*IIIC2: Positive para-aortic nodes with or without positive pelvic lymph nodes*

*IVA: Tumor invasion of bladder and / or bowel mucosa*

*IVB: Distant metastasis, including intra-abdominal metastases and / or inguinal nodes*