

Biopsia neoplásica de vagina:

Informe basado en protocolo CAP vigente, basado en AJCC/UICC TNM, 8ª ed., FIGO 2018:

- Procedimiento: excisión local. / vaginectomía parcial. / vaginectomía total. / traquelectomía..
- Localización: tercio superior / medio / inferior de vagina.
- Tipo histológico: carcinoma escamoso (asociado / no asociado a VPH / NOS). / Adenocarcinoma (NOS / asociado a VPH / de glándulas de Cowper y Littre). / carcinoma mucinoso (NOS / subtipo gástrico / intestinal). / carcinoma endometriode. / de células claras.
- Grado histológico: bien diferenciado (G1). / moderadamente diferenciado (G2). / pobremente diferenciado (G3).
- Extensión tumoral: infiltra estroma subepitelial. / músculo.
- Márgenes quirúrgicos:
 - * Márgenes laterales: a mm de margen teñido.
 - * Margen profundo: a mm de margen teñido.
- Estudio IHQ:
 - * Positividad para p16.
 - * Negatividad para p16.
- Otros hallazgos histológicos:
 - * Neoplasia intraepitelial de bajo / alto grado (L-SIL / H-SIL).
 - * Cambios inflamatorios crónicos inespecíficos.

https://documents.cap.org/protocols/Vagina.Bx_4.3.0.0.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*17abvqj*_ga*MTAyNzA1MjUxOC4xNzE3MDAzMDU5*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNzAwMzA1OC4xLjEuMTcxNzAwMzEwNy4wLjAuMA