

Pieza de resección neoplásica de vulva:

Informe basado en protocolo CAP vigente, basado en AJCC/UICC TNM, 8^a ed., FIGO 2018:

- Procedimiento: excisión local. / vulvectomía parcial. / vulvectomía total. / vulvectomía radical.
- Focalidad tumoral: unifocal. / multifocal.
- Localización: labio mayor, / menor, izquierdo / derecho. / periné. / clítoris.
- Tamaño:
 - * Dimensión mayor: cm.
 - * Dimensiones adicionales: cm.
- Tipo histológico: carcinoma escamoso (asociado / no asociado a VPH / NOS). / Adenocarcinoma (subtipo mamario / intestinal). / enfermedad de Paget extramamaria. / adenocarcinoma de células sudoríparas (apocrinas / ecrinas). / carcinoma de glándula de Bartolino.
- Grado histológico: bien diferenciado (G1). / moderadamente diferenciado (G2). / pobremente diferenciado (G3).
- Profundidad de invasión: mm.
- Bordes tumorales: crecimiento expansivo. / infiltrante.
- Infiltración de otros tejidos: no se observa. / infiltración de la vagina (tercio inferior / tercio medio / tercio superior). / uretra. / mucosa vesical. / mucosa rectal. / del ano.
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente.
- Invasión perineural: no se observa. / presente.
- Márgenes quirúrgicos:
 - * Margen profundo: a mm de margen teñido.
 - * Margen 12 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen 6 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen 9 h: a mm de margen teñido.
 - * Margen 3 h: a mm de margen teñido.
 - * Resto de márgenes alejados.
- Ganglios linfáticos regionales:
 - * Cadena inguinal: (/).
 - * Cadena femoral: (/).
 - * Cadena pélvica: (/).
 - * Cadena obturatrix: (/).
 - * Cadena ilíaca interna: (/).
 - * Cadena ilíaca externa: (/).
- Estudio IHQ:
 - * Positividad para p16.
 - * Negatividad para p16.
- Otros hallazgos histológicos:
 - * Lesión escamosa intraepitelial de bajo / alto grado (L-SIL / H-SIL).
 - * Acantosis
 - * Cambios inflamatorios crónicos inespecíficos.

**Clasificación pTNM (8^a edición): pT pN (sn) (0/)

**FIGO:

https://documents.cap.org/protocols/Vulva_5.0.0.0.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*10x2ahi*_ga*MTAyNzA1MjUxOC4xNzE3MDAzMDU5*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNzAwMzA1OC4xLjEuMTcxNzAwMzEwNy4wLjAuMA

pT

pT1a: Lesions 2 cm or less, confined to the vulva and / or perineum, and with stromal invasion of 1.0 mm or less

pT1b: Lesions more than 2 cm, or any size with stromal invasion of more than 1.0 mm, confined to the vulva and / or perineum

pT2: Tumor of any size with extension to adjacent perineal structures (lower / distal third of the murethra, lower / distal third of the vagina, anal involvement) Mucosal surface of bladder or rectum must be involved.

pT3: Tumor of any size with extension to any of the following: upper / proximal two-thirds of the urethra, upper / proximal two-thirds of the vagina, bladder mucosa, rectal mucosa, or fixed to pelvic bone

pN0(i+): Isolated tumor cells in regional lymph node(s) no greater than 0.2 mm

pN1a: One or two lymph node metastases each less than 5 mm

pN1b: One lymph node metastasis greater than or equal to 5 mm

pN2a: Three or more lymph node metastases each less than 5 mm

pN2b: Two or more lymph node metastases greater than or equal to 5 mm

pN2c: Lymph node metastasis with extranodal extension

pN3: Fixed or ulcerated regional lymph node metastasis

+FIGO Stage (2021 FIGO staging for carcinoma of the vulva)

IA: Tumor size less than or equal to 2 cm and stromal invasion less than or equal to 1 mm

IB: Tumor size greater than 2 cm or stromal invasion greater than 1 mm

II: Tumor of any size with extension to lower one-third of the urethra, lower one-third of the vagina, or lower one-third of the anus with negative nodes

IIIA: Tumor of any size with disease extension to upper two-thirds of the urethra, upper two-thirds of the vagina, bladder mucosa, rectal mucosa, or regional lymph node metastases less than or equal to 5 mm

IIIB: Regional lymph node metastases greater than 5 mm

IIIC: Regional lymph node metastases with extracapsular spread

IVA: Disease fixed to pelvic bone, or fixed or ulcerated regional lymph node metastases

IVB: Distant metastases