

## Pieza de resección apendicular con Tumor Neuroendocrino

Informe basado en protocolo CAP vigente, AJCC/UICC TNM, 8<sup>a</sup> ed.:

- Procedimiento: apendicectomía. / hemicolectomía derecha. / cecectomía.
- Localización del tumor: mitad proximal del apéndice. / mitad distal del apéndice. / afectación difusa del apéndice.
- Tipo histológico: tumor neuroendocrino.
- Grado histológico: bien diferenciado (G1). / moderadamente diferenciado (G2). / pobremente diferenciado (G3).
- Ratio mitótico:
  - \* < 2 mitosis/2mm<sup>2</sup> (recuento de X/10mm<sup>2</sup>).
  - \* Entre 2 a 20 mitosis/2mm<sup>2</sup> (recuento de X/10mm<sup>2</sup>).
  - \* > 20 mitosis/2mm<sup>2</sup> (recuento de X/10mm<sup>2</sup>).
- Índice proliferativo con ki67:
  - \* < 3 % (recuento de X%).
  - \* Entre 3 al 20% (recuento de X%).
  - \* >20% (recuento de X%).
- Tamaño tumoral:
  - \* Dimensión mayor: cm.
  - \* Otras dimensiones: cm.
- Extensión tumoral: infiltra la lámina propia. / infiltra la submucosa. / infiltra la muscular propia. / sobrepasa la muscular propia sin invadir la serosa. / infiltra la serosa.
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente (linfática / venosa / arterial).
- Invasión perineural: no se observa. / presente.
- Márgenes quirúrgicos:
  - \* Margen proximal: a mm.
  - \* Margen distal: a mm.
  - \* Margen radial: a mm.
  - \* Margen mesentérico: a mm.
- Ganglios linfáticos regionales:
  - \* Ganglios linfáticos aislados: .
  - \* Ganglios linfáticos metastatizados: (/).
- Metástasis distales: presente (indicar).
- Estudio IHQ:
  - \* Positividad para
  - \* Negatividad para
- Otros hallazgos:
  - \*

Clasificación pTNM (8<sup>o</sup> edición): pT pN (/).

[https://documents.cap.org/protocols/Appendix.NET\\_5.0.0.0.REL\\_CAPCP.pdf?\\_gl=1\\*1ermatb\\*\\_ga\\*MjA2MDA1NzI5Mi4xNzE2ODM1Mzlw\\*\\_ga\\_97ZFJSQQ0X\\*MTcxNjgzNTMxOS4xLjEuMTcxNjgzNzAzMC4wLjAuMA](https://documents.cap.org/protocols/Appendix.NET_5.0.0.0.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*1ermatb*_ga*MjA2MDA1NzI5Mi4xNzE2ODM1Mzlw*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNjgzNTMxOS4xLjEuMTcxNjgzNzAzMC4wLjAuMA)

*pT1: Tumor less than or equal to 2 cm in greatest dimension*

*pT2: Tumor greater than 2 cm but less than or equal to 4 cm in greatest dimension*

*pT3: Tumor greater than 4 cm in greatest dimension, or with subserosal invasion, or involvement of the mesoappendix*

*pT4: Tumor perforates the peritoneum, or directly invades other adjacent organs or structures (excluding direct mural extension to adjacent subserosa of adjacent bowel), e.g., abdominal wall and skeletal muscle*

*pN0: No regional lymph node metastasis has occurred*

*pN1: Regional lymph node metastasis*

*pM1a: Metastasis confined to liver*

*pM1b: Metastases in at least one extrahepatic site (e.g., lung, ovary, nonregional lymph node, peritoneum, bone)*

*pM1c: Both hepatic and extrahepatic metastases*