

## Pieza de resección gástrica con Tumor Neuroendocrino:

Informe basado en protocolo CAP vigente, AJCC/UICC TNM, 8ª ed.:

- Procedimiento: gastrectomía total. / gastrectomía parcial (distal / proximal). / resección endoscópica.
- Localización del tumor: cardias. / fundus (cara anterior / posterior). / cuerpo (cara anterior / posterior). / antro (cara anterior / posterior). / píloro.
- Tipo histológico: tumor neuroendocrino.
- Grado histológico: bien diferenciado (G1). / moderadamente diferenciado (G2). / pobremente diferenciado (G3).
- Ratio mitótico:
  - \* < 2 mitosis/2mm<sup>2</sup> (recuento de X/10mm<sup>2</sup>).
  - \* Entre 2 a 20 mitosis/2mm<sup>2</sup> (recuento de X/10mm<sup>2</sup>).
  - \* > 20 mitosis/2mm<sup>2</sup> (recuento de X/10mm<sup>2</sup>).
- Índice proliferativo con ki67:
  - \* < 3 % (recuento de X %).
  - \* Entre 3 al 20% (recuento de X %).
  - \* >20% (recuento de X %).
- Tamaño tumoral:
  - \* Dimensión mayor: cm.
  - \* Otras dimensiones: cm.
- Focalidad tumoral: unifocal. / multifocal.
- Extensión tumoral: infiltra la lámina propia. / infiltra la submucosa. / infiltra la muscular propia. / sobrepasa la muscular propia sin invadir la serosa. / infiltra la serosa. / penetra en estructuras adyacentes (especificar).
- Invasión linfovascular: no se observa. / presente (linfática/venosa/arterial).
- Invasión perineural: no se observa. / presente.
- Márgenes quirúrgicos:
  - \* Margen quirúrgico proximal: a cm.
  - \* Margen quirúrgico distal: a cm.
  - \* Margen radial (epiplón): a cm.
  - \* Margen profundo: a cm.
- Ganglios linfáticos regionales:
  - \* Ganglios linfáticos aislados: .
  - \* Ganglios linfáticos metastatizados: (/).
- Metástasis distales: especificar si presente.
- Estudio IHQ:
  - \* Positividad para
  - \* Negatividad para
- Otros hallazgos:
  - \*

Clasificación pTNM (8ª edición): pT pN (/).

[https://documents.cap.org/protocols/Stomach.NET\\_5.0.0.0.REL\\_CAPCP.pdf?\\_gl=1\\*1mv24xr\\*\\_ga\\*MjA2MDA1NzI5Mi4xNzE2ODM1Mzlw\\*\\_ga\\_97ZFJSQQ0X\\*MTcxNjgzNTMxOS4xLjEuMTcxNjgzNzAzMC4wLjAuMA](https://documents.cap.org/protocols/Stomach.NET_5.0.0.0.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*1mv24xr*_ga*MjA2MDA1NzI5Mi4xNzE2ODM1Mzlw*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNjgzNTMxOS4xLjEuMTcxNjgzNzAzMC4wLjAuMA)

*pT*

*pT1: Invades the lamina propria or submucosa and less than or equal to 1 cm in size*

*pT2: Invades muscularis propria or greater than 1 cm in size*

*pT3: Invades through the muscularis propria into subserosal tissue without penetration of overlying serosa*

*pT4: Tumor invades visceral peritoneum (serosa) or other organs or adjacent structures*

*pN*

*pN0: No regional lymph node metastasis*

*pN1: Metastasis in regional lymph nodes*

*pM Category (required only if confirmed pathologically)*

*pM1a: Metastasis confined to liver*

*pM1b: Metastases in at least one extrahepatic site (e.g., lung, ovary, nonregional lymph node, peritoneum, bone)*

*pM1c: Both hepatic and extrahepatic metastases*