

Signe pouvant indiquer une urgence lors de céphalées (maux de tête)

La céphalée est inhabituelle : c'est la première fois que vous l'avez ou bien elle ne ressemble pas à celles de d'habitude/elle est plus intense que d'habitude

La céphalée est brutal et soudaine

La céphalée s'accompagne de :

- Vomissement
- Douleur à la mâchoire/mastication
- Fatigue inexplicable
- Perte d'appétit
- Fièvre
- Hypertension artérielle
- Raideur méningée : raideur à la flexion cervicale et du dos
- Vision trouble
- Sensation de fourmillement/picotement dans les doigts, les jambes ou le visage
- Paralysie ou grande perte de force d'un membre, du visage ou d'un/des yeux
- Perte de vision d'un œil

Il y a antécédent de :

- Accouchement récent
- Infection récente
- Cancer en cours ou récent
- VIH non contrôlé
- Risque de thrombose veineuse (antécédents, ou contraceptif oral)
- Traumatisme crânien ou rachidien
- Prise de médicament ou substance vasoactive (vasoconstricteur ou dilatateur)
- Chauffage défectueux (possible émission de gaz)
- Ponction lombaire, péridurale ou infiltration rachidienne (toute opération où une aiguille vient en contact avec la colonne vertébrale)

La céphalée est :

- Grandement aggravé à la position debout
- Grandement aggravé à la position allongé
- Provoqué à la toux ou lorsque l'on va aux toilettes
- Provoqué par l'orgasme ou un effort intense