

# TRAUMATISMES DENTAIRES: QUE FAIRE?

## Premiers gestes:



1.

Se laver les mains

2.



Utiliser des compresses propres et du sérum physiologique

3.




Appliquer une poche de glace sur la zone traumatisée

4.



Prendre des antalgiques en cas de douleurs

## 3 types de traumatismes dentaires les plus fréquents




### DENT DÉFINITIVE EXPULSÉE

1. Ramasser la dent **UNIQUEMENT** par la couronne!



2. Rincer la dent 10 secondes (eau froide ou sérum physiologique).



3. Réimplanter la dent et faites mordre sur un élément rigide (compresse ou mouchoir).




4. Si la dent ne peut pas être réimplantée, la conserver (salive, sérum physiologique ou lait).




La réimplantation doit intervenir dans l'heure qui suit.

**NE PAS RÉIMPLANTER SI C'EST UNE DENT DE LAIT**



### DENT FRACTURÉE

1. Le morceau est encore en place, ne pas le **TOUCHER!**




2. Le morceau n'est plus en place: Rechercher le morceau fracturé.



3. Le conserver dans un environnement humide car il peut être recollé (sérum physiologique, lait, salive)



4. Contrôler les saignements avec une compresse propre.



### DENT DÉPLACÉE

1. Contrôler les saignements avec une compresse propre.



2. Si la dent est mobile, essayer de la remettre en place avec une pression légère des doigts.



3. Si elle est enfoncée ou immobile, ne pas essayer de la remettre dans sa position initiale.



**Dans toutes les situations, consulter rapidement un chirurgien-dentiste.**

❗ Si perte de connaissance, désorientation, vertiges, confusions problèmes d'élocution, nausées, tremblements, pupille de différentes tailles?

➔ Suspicion de **traumatisme crânien**, la priorité est d'aller aux urgences.

**La Société Française de Dentisterie du Sport recommande le port de protège-dents de manière systématique.**

Tous droits réservés - toute reproduction est interdite



SFDS\_DENTISTERIEDUSPORT