

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Glyfo Klasik® STRONG

Postřikový systémový herbicid ve formě rozpustného koncentrátu k hubení nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě, v jabloních, hrušních, na strništích orné půdy a k obnově trvalých travních porostů u luk a pastvin.

Balení pro neprofesionální uživatele.

Název a množství účinné látky: glyfosát 490 g/l, (ve formě IPA-soli 61,2 g/l, 60 % hmot.)

• **TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. • UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**

• **PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEJEZTE, NEPIJTE ANI NEKŮŘTE.**

• **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE / OCHRANNÝ ODĚV. • UNIKÝTE PRODUKT SEBERTE.**

• **ODSTRANĚTE OBSAH / OBAL JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD.**

• **DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIKU PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.**

• **SP1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČIŠŤEJTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).**

• Držitel povolení: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irsko

• Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku: AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov, tel.: 491 457 111

• Evidenční číslo přípravku: 4620-4 • Číslo šarže / Datum výroby formulace: uvedeno na vnitřním nebo vnějším obalu

• Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby, teplota skladování +5 až +30 °C.

• Množství přípravku v obalu: HDPE láhev se šroubovým uzávěrem a s přípravkem v množství 1000 ml. Balení je opatřeno odměrkou.

Způsob působení přípravku: Glyfo Klasik® Strong je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a translokací je rozveden do všech částí rostlin – podzemních kořenů, oddenků a stolonů, čím se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevely. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahynutí zasažených rostlin během 10-14 dnů. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.

Návod k použití / rozsah povoleného použití pro dělitelná balení:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
jabloň, hrušeň	plevele jednoleté, plevely vytrvalé	37 ml / 100 m ² 2,5 / vody / 100 m ²	AT	1) v období vegetačního klidu min. 2 roky staré stromy
nezemědělská půda	nežádoucí vegetace	29 – 44 ml / 100 m ² 1-2,5 / vody / 100 m ²	-	
louky a pastviny	obnova TTP	22 – 44 ml / 100 m ² 1,5 -2,5 / vody / 100 m ²	5	3) lhůta pro opětovný vstup hospodářských zvířat na pastviny
orná půda, strniště	plevele lipnicovité jednoleté, plevely dvouděložné jednoleté, výdrol obilnin	11 ml / 100 m ² 0,8 – 1,25 / vody / 100 m ²	AT	1) po sklizni
orná půda, strniště	plevele lipnicovité vytrvalé, plevely dvouděložné vytrvalé, pýr plazivý	22 – 29 ml / 100 m ² 1,5 – 2,5 / vody / 100 m ²	AT	1) po sklizni

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
hrušeň, jabloň	postřik, rosení	1x za rok
louky a pastviny	postřik	1x
orná půda, strniště, nezemědělská půda	postřik	1x za rok

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
louky a pastviny	zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům

® je ochranná známka fy AGRO CS a.s. Říkov

AGRO CS



Přípravek byl vyroben postupy, které jsou v souladu s normou ISO 14001



zde odlepte

