

# RELATIONS BINAIRES

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Relations binaires</b>	<b>1</b>
1.1	Relation d'ordre . . . . .	2
1.2	Majorants, minorants . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Relation d'équivalence</b>	<b>4</b>
2.1	Définition . . . . .	4
2.2	Un exemple important : la relation de congruence . . . . .	4
2.2.1	Congruences dans $\mathbb{Z}$ . . . . .	4
2.2.2	Congruences dans $\mathbb{R}$ . . . . .	5
2.3	Classes d'équivalences . . . . .	6

La notion de relation permet de comparer des objets mathématiques. Par exemple :

- ★ quand nous disons que 3 est inférieur ou égal à 5, nous mettons en relation les nombres 3 et 5 avec la relation « inférieur ou égal » ;
- ★ quand on dit que  $\mathbb{N}$  est inclus dans  $\mathbb{Z}$ , on compare deux ensembles à l'aide de la relation d'inclusion ;
- ★ quand nous disons que  $1 + i$  et  $1 - i$  ont même module, nous sommes en train de comparer deux nombres complexes à l'aide du module.
- ★ si  $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^x \end{cases}$  et  $g : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x + 1 \end{cases}$ , on sait que  $g \leq f$  sur  $\mathbb{R}$ , i.e. :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \leq f(x)$$

Dans tout ce chapitre,  $E$  désigne un ensemble non vide quelconque.

## I – Relations binaires

Nous définissons ici ce qu'est une relation binaire sur un ensemble.

**Définition (relation)**      ★ On appelle *relation* binaire sur  $E$  toute partie  $\mathcal{R}$  de  $E \times E$ .

★ Si  $\mathcal{R}$  est une telle relation et si  $(x, y) \in \mathcal{R}$ , on dit que «  $x$  est en relation avec  $y$  par la relation  $\mathcal{R}$  », ce que l'on note :

$$x \mathcal{R} y$$

**Exemple**      ★ Sur l'ensemble  $E = \llbracket 1, 4 \rrbracket$ , la relation  $<$  est, d'après la définition précédente, le sous-ensemble de  $E^2$  suivant :

$$< = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

En pratique, on comparera directement les éléments à l'aide de la relation.

★ Considérons la relation « divise », notée  $\mathcal{R}$  sur l'ensemble  $\llbracket 1, 4 \rrbracket$ . Autrement dit :

$$\forall (a, b) \in \llbracket 1, 4 \rrbracket, \quad a\mathcal{R}b \iff a \mid b$$

Ainsi, cette relation est complètement déterminée par les relations :

$$1 \mid 1, 1 \mid 2, 1 \mid 3, 1 \mid 4, 2 \mid 2, 2 \mid 4, 3 \mid 3 \text{ et } 4 \mid 4$$

★ Sur l'ensemble  $E = \{\text{Tom, Max, Lou, Lili}\}$ , on peut considérer la relation  $\heartsuit$  définie par :

$$\text{Lou} \heartsuit \text{Max}, \quad \text{Max} \heartsuit \text{Lou}, \quad \text{Lili} \heartsuit \text{Max} \quad \text{et} \quad \text{Tom} \heartsuit \text{Tom}$$

**Remarque :** le couple  $(x, y) \in E^2$  n'étant pas le couple  $(y, x) \in E^2$  si  $x \neq y$ , la relation  $x\mathcal{R}y$  peut être vraie sans que la relation  $y\mathcal{R}x$  le soit ! Par exemple :

- ★ Pour la relation divise ci-dessus, on a  $1 \mid 4$  mais  $4 \nmid 1$
- ★ On a  $\text{Lili} \heartsuit \text{Max}$  mais  $\text{Max} \not\heartsuit \text{Lili}$

### 1) Relation d'ordre

Les propriétés importantes que doivent vérifier les « bonnes » relations sont les suivantes.

**Définition (relation d'ordre)** Soit  $\mathcal{R}$  une relation binaire sur  $E$ . On dit que  $\mathcal{R}$  est une *relation d'ordre* sur  $E$  si elle est :

- ★ *réflexive, i.e. :*

$$\forall x \in E, \quad x\mathcal{R}x$$
- ★ *antisymétrique, i.e. :*

$$\forall x, y \in E, \quad (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \implies x = y$$
- ★ *transitive, i.e. :*

$$\forall x, y, z \in E, \quad (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z$$

On dit aussi que le couple  $(E, \mathcal{R})$  est un *ensemble ordonné*.

**Notation.** une relation d'ordre est souvent notée  $\leq$  ou  $\preceq$  ou  $\preccurlyeq$ .

**Remarque :** en pratique, on n'explicite pas l'ensemble  $\mathcal{R}$  (comme sous-ensemble de  $E^2$ ) mais on manipule directement la relation en comparant les éléments de  $E$  *via* cette relation.

**Exemple** ★ Sur  $\mathbb{R}$ , la relation  $\leq$  est une relation d'ordre. En effet :

- pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a bien  $x \leq x$  ;
- pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , si  $x \leq y$  et  $y \leq x$ , alors  $x = y$  ;
- pour tout  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , si  $x \leq y$  et  $y \leq z$ , alors  $x \leq z$ .

- ★ Sur  $\mathcal{P}(E)$ , la relation  $\subset$  est une relation d'ordre.
- ★ Sur  $\mathbb{N}$ , la relation  $\mid$  est une relation d'ordre.

**Démonstration** • Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors  $n = 1 \times n$  et  $1 \in \mathbb{N}$  donc  $n \mid n$ . Ainsi, la relation  $\mid$  est réflexive sur  $\mathbb{N}$ .

• Soient  $m, n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $m \mid n$  et que  $n \mid m$ . Il existe alors  $k, \ell \in \mathbb{N}$  tels que  $n = km$  et  $m = \ell n$ . Par conséquent, on a  $n = \ell kn$  donc  $(1 - \ell k)n = 0$ . Si  $n = 0$ , alors  $m = \ell \times 0 = 0$  donc  $m = n$ . Sinon, on a  $\ell k = 1$ , et comme  $\ell, k \in \mathbb{N}$ , il vient  $\ell = k = 1$ , d'où l'on tire que  $m = n$ . Dans les deux cas, on a bien  $m = n$ . La relation  $\mid$  est donc antisymétrique sur  $\mathbb{N}$ .

- Soient  $m, n, p \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $m \mid n$  et que  $n \mid p$ . Il existe alors  $k, \ell \in \mathbb{N}$  tels que  $n = km$  et  $p = \ell n$ . Ainsi :

$$p = \ell n = \ell(km) = (\ell k)m$$

Comme  $\ell k \in \mathbb{N}$ , on a bien  $m \mid p$ . La relation  $\mid$  est donc transitive sur  $\mathbb{N}$ .

Finalement,  $\mid$  est une relation d'ordre sur  $\mathbb{N}$ . ■

- ★ Sur  $\mathbb{Z}$ , la relation  $\mid$  n'est pas une relation d'ordre (en effet, elle n'est pas antisymétrique car  $4 \mid -4$  et  $-4 \mid 4$ ; pourtant  $4 \neq -4$ ).
- ★ Sur  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ , la relation  $\leq$  est une relation d'ordre.
- ★ La relation  $\heartsuit$  n'est pas une relation d'ordre (par exemple car elle n'est pas réflexive).

**Définition (ordre partiel, ordre total)** Soit  $(E, \mathcal{R})$  un ensemble ordonné. On dit l'ordre est *total* sur  $E$  (ou que  $(E, \mathcal{R})$  est un ensemble *totalelement ordonné*) si :

$$\forall x, y \in E, \quad x \mathcal{R} y \text{ ou } y \mathcal{R} x$$

Dans le cas contraire, on dit que l'ordre sur  $E$  est *partiel*.

**Remarque :** dire que  $\mathcal{R}$  est une relation d'ordre totale sur  $E$  signifie donc que deux éléments quelconques  $x$  et  $y$  de  $E$  peuvent être comparés ; on a nécessairement ou bien  $x \mathcal{R} y$ , ou bien  $y \mathcal{R} x$ .

**Exemple** ★ L'ensemble  $(\mathbb{R}, \leq)$  est totalement ordonné.

- ★ Par contre,  $(\mathcal{P}(E), \subset)$  est partiellement ordonné dès que  $|E| \geq 2$ .
- ★ De même, l'ordre  $\leq$  sur  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  est partiel.
- ★ La relation d'ordre  $\mid$  sur  $\mathbb{N}$  n'est pas totale (en effet, 4 et 5 ne sont pas en relation).
- ★ La relation  $\heartsuit$  est partielle (on ne peut pas comparer Tom et Lili).

## 2) Majorants, minorants

On peut généraliser les notions de majorant, minorant, maximum et minimum vus dans  $\mathbb{R}$  à un ensemble ordonné.

**Définition (majorant, minorant)** Soient  $(E, \preceq)$  un ensemble ordonné,  $A \in \mathcal{P}(E)$  et  $x \in E$ .

- ★ On dit que  $x$  est un *majorant* de  $A$  si :

$$\forall a \in A, \quad a \preceq x$$

On dit aussi que  $A$  est majoré par  $x$  (pour la relation  $\preceq$ ).

- ★ On dit que  $x$  est le *maximum*  $A$  (ou le *plus grand élément* de  $A$ ) si :

$$x \in A \quad \text{et} \quad (\forall a \in A, \quad a \preceq x)$$

On note alors  $x = \max(A, \preceq)$ .

- ★ On dit que  $x$  est un *minorant* de  $A$  si :

$$\forall a \in A, \quad x \preceq a$$

- ★ On dit que  $x$  est le *minimum* de  $A$  (ou le *plus petit élément* de  $A$ ) si :

$$x \in A \quad \text{et} \quad (\forall a \in A, \quad x \preceq a)$$

On note alors  $x = \min(A, \preceq)$ .

- ★ On dira que l'ensemble  $A$  est bornée s'il est à la fois minoré et majoré.

**Remarque :** la définition sous-entend l'unicité du maximum et/ou du minimum lorsqu'il(s) existe(nt), ce qui s'obtient avec la propriété d'antisymétrie de la relation *preccurlyeq* (il est ici supposé que  $\preccurlyeq$  est une relation d'ordre).

**Exemple**      ★ Pour la relation  $\leq$ , l'ensemble  $\mathbb{R}$  n'est ni majoré, ni minoré (en particulier, il n'admet ni minimum, ni maximum).

★ Pour la relation  $\leq$ , l'ensemble  $[0, 1[$  est majoré par 1, n'admet pas de maximum, est minoré par  $-5$  et cet ensemble ordonné admet 0 pour minimum.

★  $(\mathbb{N}, |)$  admet pour minimum 1 et pour maximum 0 (en effet, tout entier naturel  $n$  divise 0 puisque l'on peut écrire  $0 = n \times 0$ ).

★  $(\mathcal{P}(E), \subset)$  est minoré par  $\emptyset$  et majoré par  $E$ . Par ailleurs :

$$\emptyset = \min(\mathcal{P}(E), \subset) \quad \text{et} \quad E = \max(\mathcal{P}(E), \subset)$$

L'ensemble  $\mathcal{P}(E)$  est donc borné pour la relation  $\subset$ .

## II – Relation d'équivalence

### 1) Définition

**Définition (relation d'équivalence)**      Une relation  $\mathcal{R}$  sur  $E$  est appelée une *relation d'équivalence* si elle est :

★ *réflexive, i.e. :*

$$\forall x \in E, \quad x\mathcal{R}x$$

★ *symétrique, i.e. :*

$$\forall x, y \in E, \quad x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$$

★ *transitive, i.e. :*

$$\forall x, y, z \in E, \quad (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z$$

**Exemple**      ★ La relation d'égalité  $=$  sur  $E$  est une relation d'équivalence (c'est aussi une relation d'ordre).

★ Soit  $F$  un ensemble non vide et  $f \in F^E$ . La relation  $\mathcal{R}$  définie par :

$$\forall x, y \in E, \quad x\mathcal{R}y \iff f(x) = f(y)$$

est une relation d'équivalence sur  $E$ .

★ La relation  $\heartsuit$  n'est pas une relation d'équivalence.

★ Sur  $\mathbb{N}$ , la relation de divisibilité  $|$  n'est pas une relation d'équivalence (la propriété de symétrie étant mise en défaut). Il s'agit par contre d'une relation d'ordre.

★ Dans  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ , la relation  $\leq$  est une relation d'ordre qui n'est pas une relation d'équivalence.

### 2) Un exemple important : la relation de congruence

#### (a) Congruences dans $\mathbb{Z}$

**Définition (congruence)** Soient  $a, b, n \in \mathbb{Z}$ . On dit que  $a$  est congru à  $b$  modulo  $n$ , noté  $a \equiv b [n]$ , s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $a = b + kn$ .

**Exemple** On a  $7 \equiv 3 [2]$ ,  $13 \equiv -1 [7]$ .

**Remarques :**

- ★ La congruence modulo 0 est tout simplement la relation d'égalité.
- ★ La congruence modulo 1 est la relation triviale : tous les entiers sont congrus entre eux modulo 1.
- ★ Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , la congruence modulo  $n$  est la congruence modulo  $-n$  (cela ne change rien à remplacer  $n$  par  $-n$  dans la définition précédente).

**Proposition** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . La congruence modulo  $n$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ .

**Démonstration** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrons que la relation de congruence modulo  $n$  est réflexive, symétrique et transitive.

- ★ Soit  $a \in \mathbb{Z}$ . On peut écrire que  $a = a + 0 \times n$  (et  $0 \in \mathbb{Z}$ ) donc  $a \equiv a[n]$ . La relation est donc réflexive.
- ★ Soit  $a, b \in \mathbb{Z}$ . On suppose que  $a \equiv b[n]$ . Alors il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $a = b + kn$ , ce que l'on peut réécrire :

$$b = a + (-k)n$$

Comme  $-k \in \mathbb{Z}$  (puisque  $k \in \mathbb{Z}$ ), on a aussi  $b \equiv a[n]$ . La relation est donc symétrique.

- ★ Soit  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ . On suppose que  $a \equiv b[n]$  et  $b \equiv c[n]$ . Alors il existe  $(k, \ell) \in \mathbb{Z}^2$  tel que :

$$a = b + kn \quad \text{et} \quad b = c + \ell n$$

Par conséquent :

$$a = (c + \ell n) + kn = c + (\ell + k)n$$

Comme  $\ell + k \in \mathbb{Z}$  (puisque  $\ell$  et  $k$  sont des entiers), on a la relation  $a \equiv c[n]$ . La relation est donc aussi transitive.

Finalement, la congruence modulo  $n$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$ . ■

### (b) Congruences dans $\mathbb{R}$

**Définition (congruence)** Soient  $a, b, \alpha \in \mathbb{R}$ . On dit que  $a$  est congru à  $b$  modulo  $\alpha$ , noté  $a \equiv b[\alpha]$ , s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $a = b + kn$ .

**Remarques :**

- ★ Dans la définition, le  $k$  est un entier. La congruence modulo 0 est tout simplement la relation d'égalité.
- ★ Nous utiliserons souvent la relation de congruence modulo  $2\pi$  (ou  $\pi$ ).

**Exemple**  $\frac{13\pi}{6} \equiv \frac{\pi}{6} [\pi]$

**Proposition** Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . La congruence modulo  $\alpha$  est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{R}$ .

**Démonstration** La démonstration est identique à la précédente. ■

### 3) Classes d'équivalences

La notion de classe d'équivalence permet de rassembler, dans un ensemble muni d'une relation d'équivalence, tous les éléments qui sont en relation.

**Définition (classe d'équivalence)** Soit  $\mathcal{R}$  une relation d'équivalence sur  $E$ .

- ★ Soit  $x \in E$ . On appelle *classe (d'équivalence) de  $x$  modulo  $\mathcal{R}$*  l'ensemble noté  $\bar{x}$  des éléments de  $E$  qui sont en relation avec  $x$  pour la relation  $\mathcal{R}$ , i.e. :

$$\bar{x} = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}$$

- ★ L'ensemble des classes d'équivalences de  $E$  pour la relation  $\mathcal{R}$  est noté  $E/\mathcal{R}$ . Autrement dit :

$$E/\mathcal{R} = \{\bar{x} \mid x \in E\}$$

Cet ensemble est aussi appelé *ensemble quotient de  $E$  par la relation  $\mathcal{R}$* .

**Remarque :**  $E/\mathcal{R}$  est donc un ensemble de sous-ensembles de  $E$ . Autrement dit,  $E/\mathcal{R} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(E))$ .

**Proposition** Soient  $\mathcal{R}$  une relation d'équivalence sur  $E$  et  $x, y \in E$ . Si  $x\mathcal{R}y$ , alors  $\bar{x} = \bar{y}$ .

**Démonstration** On raisonne par double inclusion.

- ★ Soit  $z \in \bar{x}$ . Alors  $z\mathcal{R}x$ . Si  $x\mathcal{R}y$ , alors  $z\mathcal{R}y$  par transitivité de  $\mathcal{R}$ . On a donc  $\bar{x} \subset \bar{y}$ .
- ★ On obtient l'autre inclusion de manière analogue.

Par double inclusion, on a bien l'égalité annoncée. ■

**Exemple** Soient  $a, n \in \mathbb{N}$ . La classe d'équivalence de  $a$  pour la relation de congruence modulo  $n$  est :

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a [n]\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}, b = a + kn\} \\ &= \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

Par exemple, pour  $n = 2$ , on a :

$$\bar{0} = 2\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \bar{1} = 2\mathbb{Z} + 1$$

La famille des classes d'équivalences de  $E$  (pour la relation  $\mathcal{R}$ ) est une partition de l'ensemble  $E$  d'après le résultat suivant.

**Proposition** Soient  $E$  un ensemble et  $\mathcal{R}$  une relation d'équivalence sur  $E$ . Alors  $(C)_{C \in E/\mathcal{R}}$  est une partition de  $E$ , i.e. :

- (i)  $\forall C \in E/\mathcal{R}, C \neq \emptyset$ ;
- (ii)  $\forall C, C' \in E/\mathcal{R}, C \neq C' \implies C \cap C' = \emptyset$ ;
- (iii)  $\bigcup_{C \in E/\mathcal{R}} C = E$ .

**Démonstration** Pour tout  $x \in E$ , on note  $\bar{x}$  la classe d'équivalence de  $x$  dans  $E$  pour la relation  $\mathcal{R}$ .

- (i) Soit  $C \in E/\mathcal{R}$ . Par définition d'une classe d'équivalence, il existe  $x \in E$  tel que  $C = \bar{x}$ . Par réflexivité de la relation d'équivalence, on a  $x\mathcal{R}x$  donc  $x \in C$ . Ainsi,  $C$  est non vide.
- (ii) Soient  $C, C' \in E/\mathcal{R}$ . Par définition d'une classe d'équivalence, il existe  $x, y \in E$  tels que  $C = \bar{x}$  et  $C' = \bar{y}$ . Raisonnons maintenant par contraposition. Supposons que  $C \cap C' \neq \emptyset$ , alors il existe  $z \in E$  tel que  $z \in C \cap C'$ . D'après la proposition précédente, on a  $C = \bar{z} = C'$ .
- (iii) Pour tout  $x \in E$ , on a  $x \in \bar{x}$  donc  $C \subset \bigcup_{C \in E/\mathcal{R}} C = E$ . L'inclusion réciproque est immédiate. ■

**Remarque :** le théorème de la division euclidienne (chapitre « Arithmétique des entiers relatifs ») nous permettra de montrer que, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , tout entier relatif appartient à la classe d'équivalence, pour la relation de congruence modulo  $n$ , d'un et un seul élément de  $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$ . Les classes d'équivalence de  $\mathbb{Z}$  pour cette relation sont donc les ensembles  $k + n\mathbb{Z}$ , où  $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ . On note traditionnellement  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  l'ensemble quotient formé de ces classes d'équivalence.