

# DÉRIVABILITÉ

## 1 Définition de la dérivabilité

**Exercice 1** Étudier la dérivabilité sur  $\mathbb{R}$  des fonctions suivantes :

1.  $f : x \mapsto \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ (x-1)^3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$  ;
2.  $g : x \mapsto \begin{cases} x^2 + x & \text{si } x \leq 1 \\ ax^3 + bx + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ , où  $a, b \in \mathbb{R}$ ;
3.  $h : x \mapsto \frac{|x|}{1 + |x^2 - 1|}$ .

**Exercice 2 (symétries de  $f'$ )** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

1. On suppose que  $f$  est paire sur  $\mathbb{R}$ . Que dire de la fonction  $f'$  ?
2. Et si  $f$  est impaire? périodique?

**Exercice 3** Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable en  $a$ . Calculer la limite :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a+h^2)}{h}$$

**Exercice 4** Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f \in \mathcal{D}([a, b], \mathbb{R})$ . On suppose que :

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) > 0 \quad \text{et} \quad f'(b) > 0$$

Montrer que  $f$  s'annule sur  $]a, b[$ .

**Exercice 5 (équations différentielles et recollements)** 1. On note  $(E)$  l'équation différentielle  $(1-x)y' = y + 2x$  d'inconnue  $y \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

- (a) Résoudre  $(E)$  sur les intervalles  $]-\infty, 1[$  et  $]1, +\infty[$ .
- (b) Résoudre  $(E)$  sur  $\mathbb{R}$  en procédant par analyse-synthèse.
2. Même question pour l'équation différentielle  $x^2y' - y = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Même question pour l'équation différentielle  $(x+1)y' - 2y = x$  sur  $\mathbb{R}$ .

## 2 Dérivées successives

**Exercice 6** Calculer les dérivées successives des fonctions suivantes :

- |                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1. $x \mapsto a^x$ ( $a > 0$ ) | 2. $x \mapsto x^\alpha$ ( $\alpha \in \mathbb{R}$ ) | 3. $\sin$                  |
| 4. $x \mapsto \frac{1}{x+a}$   | 5. $x \mapsto \frac{1+x}{1-x}$                      | 6. $x \mapsto \ln(3-2x)$   |
| 7. $x \mapsto \frac{1}{x^2-1}$ | 8. $x \mapsto x^3 e^x$                              | 9. $x \mapsto x^2 \sin(x)$ |

**Exercice 7** 1. Soit  $f : x \mapsto e^{x^2}$ . Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ , il existe une fonction polynomiale  $P_n$  telle que  $f^{(n)} : x \mapsto P_n(x) e^{x^2}$ . Préciser le degré de  $P_n$ .

2. Soit  $g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ . Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ , il existe une fonction polynomiale  $P_n$  telle que  $g^{(n)} : x \mapsto \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}}$ . Préciser le degré de  $P_n$ .

## 3 Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

**Exercice 8** Soient  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$  et  $P$  une fonction polynôme admettant  $n$  racines réelles distinctes. Montrer  $P'$  admet au moins  $n-1$  racines réelles distinctes.

**Exercice 9 (accroissements finis)** Montrer que :

1. pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ,  $|\operatorname{Arctan}(x) - \operatorname{Arctan}(y)| \leq |x - y|$ ;
2. pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $x \leq e^x - 1 \leq x e^x$ ;
3. pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $0 \leq \operatorname{ch}(x) - 1 \leq x \operatorname{sh}(x)$ .

**Exercice 10** 1. Montrer que :

$$\forall x > 0, \quad \frac{1}{x+1} < \ln(1+x) - \ln(x) < \frac{1}{x}$$

2. En déduire, pour tout  $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ , la limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p}$ .

**Exercice 11** Soient  $a > 0$  et  $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable telle que :

$$f(0) = f(a) = 0 \quad \text{et} \quad f'(0) = 0$$

1. Montrer que la dérivée de la fonction  $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$  s'annule sur  $]0, a[$ .

2. En déduire qu'il existe un point autre que l'origine en lequel la tangente à la courbe représentative de  $f$  passe par l'origine.

**Exercice 12** Soient  $a > 0$  et  $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$  telle que  $f(0) = f'(0) = 0$  et  $f(a)f'(a) < 0$ . Montrer qu'il existe  $b \in ]0, a[$  tel que  $f'(b) = 0$ .

**Exercice 13 (règle de l'Hôpital)** Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions continues sur  $[a, b]$  et dérivables sur  $]a, b[$ .

1. Montrer qu'il existe  $c \in ]a, b[$  tel  $f'(c)(f(b) - f(a)) = f'(c)(g(b) - g(a))$ .
2. En déduire que si  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \ell$ .
3. Application : déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x) - e^x}{(x+1)e^x - 1}$ .

## 4 Dérivabilité d'une fonction réciproque

**Exercice 14 (fonction Argth)** 1. Justifier que la fonction  $\text{th}$  induit une application bijective de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle à déterminer.

2. Déterminer l'application réciproque de cette bijection. *Cette réciproque est notée Argth et est appelée fonction argument tangente hyperbolique.*
3. En utilisant deux méthodes différentes, étudier la dérivable de la fonction Argth et calculer sa dérivée.

**Exercice 15** On considère la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $I = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$  par :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

1. Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  que l'on précisera.
2. Que peut-on dire de  $f^{-1}$ ? Donner sur le même graphique l'allure des courbes représentatives de  $f$  et de  $f^{-1}$ .
3. Justifier que :

$$\forall x \in J, \quad \cos(f^{-1}(x)) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \sin(f^{-1}(x)) = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

4. Montrer que  $f^{-1}$  est dérivable sur  $J \setminus \{1\}$  et que :

$$\forall x \in J \setminus \{1\}, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

## 5 Suites récurrentes

**Exercice 16** On considère la fonction  $f : x \mapsto \frac{2x}{\ln(x) + 1}$  sur  $[1, +\infty[$ .

1. Justifier l'existence de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - e| \leq \frac{e-1}{2^n}$$

3. Que peut-on en déduire ?

**Exercice 17** Soit  $u_0 \in [0, 1]$ . On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{e^{u_n} + 1}$$

1. Montrer que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est à valeurs dans  $[0, 1]$ .
2. Montrer qu'il existe un unique nombre réel  $\alpha$  tel que  $\frac{e^\alpha}{e^\alpha + 1} = \alpha$ , et que  $\alpha \in [0, 1]$ .
3. (a) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\alpha$ .

- (b) Déterminer à la main un rang  $n$  explicite pour lequel  $u_n$  est une approximation de  $\alpha$  à  $10^{-5}$  près.

## 6 Limite de la dérivée

**Exercice 18** Montrer que la fonction  $f : x \mapsto x^2 \ln(x)$  est prolongeable en une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ .

**Exercice 19** 1. Déterminer la dérivée de  $x \mapsto \ln(|x|)$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

2. Pour quelle valeur maximale de  $k \in \mathbb{N}$  la fonction  $x \mapsto \begin{cases} x^3 \ln(|x|) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$  est-elle de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $\mathbb{R}$ ?

**Exercice 20** Soit  $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  telle que  $f'(0) = 0$ . Montrer qu'il existe une fonction  $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$  telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f(x) = g(x^2)$$