

PORTOCATH

- LEITO RESERVADO SR – RX
(se paciente NÃO internado)
- básica 1
- 1 Kit de campos completo
- 1 campo plástico
- ecografo e capa
- **NÃO** abrir cautério caneta de cautério
- monocryl 3-0
- SF 0,9% 500ml
- 1 seringas 20ml e 1 seringa 10ml
- luva 7,5
- lamina 15
- bupi 0,5 com vaso
- lidocaina 2% com vaso
- eletrodos e oximetria
- steristrip
- 1 tegaderm M **(apenas se internado)**
- clorex com álcool
- 1 kit portocath perfil baixo
- 1 agulha vermelha **(não abrir outras agulhas)**
- 1 pacote compressas e 1 de gazes

PELE (EXÉRESE + SUTURA)

- básica 1 ou plastica
- campo estéril
- 1 caneta de cautério
- 1 BIPOLAR **(ter em sala – não abrir)**
- monocryl 3-0 / nylon 3 e 4-0 / vicryl 3-0 **(NAO ABRIR)**
- 1 seringa **10ml**
- luva 7,5
- lamina 15
- lidocaina 1% sem vaso **(esperar para abrir)**
- lidocaina 2% com vaso **(esperar para abrir)**
- oximetria
- steristrip
- micropore
- clorex com álcool **(aquoso se mucosa)**
- frasco anatomo e laboratório (não abrir)
- 1 agulha preta, 1 agulha insulina e 1 vermelha
- 1 pacote compressas e 1 de gazes