

METALIK - S

MICROELEMENTOS PARA PLANTAS

METALIK-S

Es una solución ácida, color verde claro, con los 9 microelementos claves para una óptima nutrición y activación de la planta, esenciales en proceso de oxidación.

COMPOSICIÓN:

RIQUEZAS GARANTIZADAS	
Magnesio (MgO)	0.08% P/V
Manganeso (MnO)	5.00% P/V
Boro (B ₂ O ₃)	2.00% P/V
Hierro (Fe)	1.00% P/V
Cobre (Cu)	0.80% P/V
Zinc (Zn)	0.08% P/V
Molibdeno (Mo)	0.20% P/V
Niquel (Ni)	0.09% P/V
Cobalto (Co)	0.09% P/V
Ácido Tartárico	4.50% P/V
pH	1.1
Densidad	1.25 g/mL
Apariencia	Líquido concentrado soluble

BENEFICIOS:

Corrige diversas deficiencias causadas por falta de estos elementos, evitando el amarillamiento (clorosis) y promueve el desarrollo de la pigmentación natural de las plantas (antocianinas y carotenos), mejorando la calidad de flores y frutos.

PROPIEDADES:

Puede ser asimilado fácilmente por la planta sin toxicidad o daños, gracias al Ácido tartárico, agente quelante de origen vegetal. Por esta razón, no promueve la caída de flores al ser aplicado antes de la floración.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Nombre comercial: METALIK - S
- Tipo: Nutriente para plantas
- Uso: Agrícola
- Presentaciones: 500 mL, 1L, 5L y 16 Lts.
- Dosis por aplicación: 250cc a 300cc por cada 200 Lts de agua.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser mezclado con otros agroquímicos, salvo indicación contraria.

ALMACENAJE:

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis cc/200Lt.	Recomendaciones
ALGODÓN.	250 - 300 250 - 300	Aplicar 3 – 4 veces desde la aparición de las hojas verdaderas, hasta el inicio del bellotaje.
PAPA.	250 - 300 250 - 300 250 - 300	1ra: Con 5- 6 hojas 2da. Después del aporque o al inicio de la floración. 3ra. 15 días después de la 2da aplicación.
ESPÁRRAGO.	250 - 300	Aplicar 3-4 veces desde el inicio del desarrollo vegetativo, hasta antes de tener 50% de frutos maduros.
FRUTALES: PALTO. MANGO, DURAZNO, MANZANO, CÍTRICOS.	250 - 300	Después de la cosecha, antes de la floración y después del cuajado.
LEGUMINOSAS: FRIJOLES, VAINITAS, PALLAR.	250	Aplicar 3-4 veces durante todo el periodo vegetativo y comienzo del llenado de las vainas.
HORTALIZAS: COLIFLOR, COL, LECHUGA.	250	A partir de los 20 días del trasplante, y durante el periodo vegetativo.
CURCUBITÁCEAS: MELÓN, SANDÍA, ZAPALLO, PEPINILLO.	250 - 300 250 - 300 250 - 300	1ra: con 3-4 hojas 2da: Aplicar en botón floral 3ra: Después del cuajado para el rellenado de frutos.
TOMATE, AJÍ, PÁPRIKA, AJÍ ESCABECHE.	250 - 300	Aplicar después del trasplante hasta antes del inicio de la floración, y durante todo el periodo vegetativo.
CEBOLLA, AJO, APIO.	250	A partir de los 30 días después del trasplante y durante todo el periodo vegetativo.
CEREALES: MAÍZ, TRIGO, ARROZ.	250 - 300	Aplicar sobre los brotes y hojas 2-3 veces después del macollaje y antes del espigado durante el periodo vegetativo.
FLORES: MARIGOLD, ROSAS, CLAVEL, CRISANTEMUS.	250 250	1ra. Aplicación foliar antes de la floración. 2da. A los 20 días después de la primera.
CACAO-CAFÉ.	250 - 300	Aplicar después del cuajado de frutos.
VID.	250 - 300	Aplicar después del cuajado de frutos y antes del quemado.