

VITALIK - B

CORRECTOR DE CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES

VITALIK-B

Es un corrector de carencias de Boro en forma líquida. El boro es un microelemento necesario para conseguir una equilibrada nutrición en las plantas.

COMPOSICIÓN:

RIQUEZAS GARANTIZADAS	
Boro (B)	15% P/V
Monoetanolamina	4% P/V
pH	8
Densidad	1.1 g/mL
Apariencia	Líquido soluble

BENEFICIOS:

Esencial en la germinación del polen, cuajado de los frutos y transporte de los azúcares. Permite un adelanto en la floración de entre 10 a 14 días.

Interviene en la síntesis de compuestos fenólicos relacionados con crecimiento, división celular y regulación hormonal. Previene desórdenes fisiológicos que conlleva su carencia.

PROPIEDADES:

Es poco móvil y pocas veces dinámico, las raíces jóvenes lo absorben con mucha facilidad en comparación a las más adultas. Determinante en la viabilidad del polen, facilita el ingreso de moléculas de azúcares, a través, de la membrana celular.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Nombre comercial: VITALIK - B
- Tipo: Corrector de carencias
- Uso: Agrícola
- Presentaciones: 1L., 5L., 20Lts. y 200 Lts.
- Dosis por aplicación: 500cc - 1000cc por cada 200 Lts de agua.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con aceites, sulfatos o productos que los contengan. Salvo indicación contraria.

ALMACENAJE:

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis cc/200Lt.	Dosis Lt./Ha.	Recomendaciones
ALGODÓN.	500	3 hasta 6	Aplicar después, desahije, inicio del botoneo y al desarrollo de las bellotas.
PAPA.	500	3 hasta 6	Al inicio de la tuberización y llenado del tubérculo.
ESPÁRRAGO.	500	3 hasta 6	En el 1er, 2do brote y 20 a 30 días antes del chapodo.
FRUTALES: PALTO, MANGO, DURAZNO, MANZANO, CÍTRICOS.	300-500	3 hasta 6	Al inicio del botoneo, al desarrollo y maduración del fruto.
LEGUMINOSAS: FRIJOLES, PALLAR, VAINITAS.	300-500	3 hasta 6	Al inicio del botoneo y llenado de frutos.
HORTALIZAS: COLIFLOR, COL, LECHUGA.	300-500	3 hasta 6	Aplicar después del trasplante, luego repetir a los 15 – 20 días.
CURCUBITÁCEAS: MELÓN, SANDÍA, ZAPALLO.	300-500	3 hasta 6	Aplicar antes de la floración y después del cuajado.
TOMATE, AJÍ, PÁPRIKA.	300-500	3 hasta 6	Aplicar antes de la floración, después del cuajado y al llenado de frutos.
CEBOLLA, AJO, APIO.	300-500	3 hasta 6	Aplicar al inicio del bulbeo y luego repetir a los 15 - 20 días.
VID.	300-500	3 hasta 6	Aplicar en prefloración, después del cuajado y en la etapa de envero.