

# VITALIK - Ca

## CORRECTOR DE CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES

### VITALIK-Ca

Es un corrector de carencias de calcio en forma líquida, para su uso vía foliar o en fertirrigación.

### COMPOSICIÓN:

RIQUEZAS GARANTIZADAS	
Calcio (Óxido de Calcio CaO)	15% P/V
Nitrógeno (N)	9.7% P/V
Aminoácidos	0.5% P/V
pH	5
Densidad	1.1 g/mL
Apariencia	Líquido ámbar soluble

### BENEFICIOS:

Permite la formación de compuestos que son parte de las paredes celulares, fortaleciendo así la estructura de la planta. Una raíz con un crecimiento pobre o unas hojas con las puntas gelatinosas son los síntomas más frecuentes de una deficiencia en calcio.

### PROPIEDADES:

Participa en la división y extensión celular, influye en compartimentalizar y especializar funciones en los orgánulos. Contribuye al equilibrio iónico del mismo y modula la acción de las hormonas y estabiliza la pared celular y membranas, lo que aumenta la resistencia mecánica de los frutos y tallos.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Nombre comercial: VITALIK - Ca
- Tipo: Corrector de carencias
- Uso: Agrícola
- Presentaciones: 1L., 5L., 20Lts. y 200 Lts.
- Dosis por aplicación: 500cc - 1000cc por cada 200 Lts de agua.

### COMPATIBILIDAD:

No mezclar con aceites, sulfatos o productos que lo contengan.

### ALMACENAJE:

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

## RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis cc/200Lt.	Dosis Lt./Ha.	Recomendaciones
ALGODÓN.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar después de la floración, luego repetir a los 15 días.
PAPA.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar al inicio de la tuberización y luego repetir a los 15-20 días.
ESPÁRRAGO.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar en el primer brote y 15 días.
FRUTALES: PALTO, MANGO, DURAZNO, MANZANO, CÍTRICOS.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar al cuajado de frutos, repetir cada 15 días en 2-3 aplicaciones.
LEGUMINOSAS: FRIJOLE, PALLAR, VAINITAS.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar al inicio del botoneo y después del cuajado.
HORTALIZAS: COLIFLOR, COL, LECHUGA.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar a la formación de la cabeza y repetir cada 7 a 15 días.
CURCUBITÁCEOS: MELÓN, SANDÍA, ZAPALLO.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar al botoneo, cuajado y llenado de frutos cada 15 días.
TOMATE, AJÍ, PIMIENTO, PÁPRIKA.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Cuando los frutos entren cuajados y cuando tengan de 3 a 5 cm, repetir en 3 aplicaciones.
CEBOLLA, AJO, APIO.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar en la etapa de crecimiento para el fortalecimiento y evitar el "acarme" en 3 aplicaciones cada 15 días.
VID.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar cuando la uva tenga 5 mm de diámetro, repetir cada 15 días. Se busca homogenizar el grano y evitar el secado de granos y desgrane.
CAFÉ.	500-1Lt.	8-10 Lt.	Aplicar antes de la floración y después, en intervalos de 15 a 20 días.