

VITALIK - Ca B - Zn

CORRECTOR DE CARENCIAS DE MICRONUTRIENTES

VITALIK-CaB-Zn

Es un bionutriente con acción sistemática para aplicaciones foliares corrector de nutrientes sinergizado con CALCIO, BORO y ZINC.

COMPOSICIÓN:

RIQUEZAS GARANTIZADAS	
Calcio (Óxido de Calcio CaO)	12% P/V
Boro (B)	1% P/V
Zinc (Zn)	2% P/V
Excipientes	5% P/V
pH	5
Densidad	1.1 m/gL
Apariencia	Líquido ámbar soluble

BENEFICIOS:

Evita caída de flores, mejora el cuajado y reduce la caída de los frutos.

PROPIEDADES:

Es altamente soluble al agua, cada componente es importante para el desarrollo de raíces y hojas, germinación de granos de polen, en el cuajado de frutos, transporte de los azúcares, formación de clorofila y a resistir a bajas temperaturas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Nombre comercial: VITALIK-CaB-Zn
- Tipo: Corrector de carencias
- Uso: Agrícola
- Presentaciones: 1L., 5L., 20 Lts y 200 Lts.
- Dosis por aplicación: 500cc - 1000cc por cada 200 Lts de agua.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser mezclado con otros productos, también ácidos, salvo indicación contraria.

ALMACENAJE:

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis cc/200Lt.	Dosis Lt./Ha.	Recomendaciones
TOMATE AJÍ PÁPRIKA, PIMIENTO.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar a inicios de floración. 2da aplicación en la caída de flores. 3era aplicación a los 15 días de inicio de cuajado. 4ta aplicación, a los 30 días del inicio del cuajado.
PAPA, CAMOTE.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar al inicio de la tuberización, luego cada 15-20 días.
ESPÁRRAGO.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar en la apertura de filocladios de 20 a 30 días después de la cosecha. 2da aplicación, en la apertura de filocladios del segundo brote, 3era aplicación, 30 días después de la segunda aplicación.
PALTO, MANGO, DURAZNO, MANZANO, UVA, CÍTRICOS.	0.5-1L.	2 - 4	Aplicar al inicio de la floración, en el cuajado de los frutos y 30 días después de la última aplicación.
CEBOLLA, AJO.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar al inicio de llenado de bulbo, repetir a los 15-20 días después de la primera dosis.
APIO, COLIFLOR, LECHUGA, COL.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar a los 15 a 20 días después del trasplante. Aplicaciones posteriores cada 15 días.
FRIJOLES, PALLAR, VAINITAS.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar en la prefloración, al inicio del cuajado de vainas y después a los 15-20 días.
MELÓN, SANDÍA, ZAPALLO, PEPINILLO.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar en la floración, al inicio del cuajado y después a los 15-20 días.
ALGODÓN.	0.5-1L.	1 - 2	Aplicar en la prefloración. 2da aplicación, al inicio de cuajado de vainas. 3era aplicación a los 15-20 días.
ARÁNDANO.	0.5-1L.	2 - 4	1era aplicación, al inicio de la floración. 2da aplicación en la floración. 3era aplicación cada 30-45 días durante la campaña.