

VITALIK - MgO

CORRECTOR DE CARENCIAS DE MAGNESIO

VITALIK-MgO

Es una formulación líquida indicado para corregir carencias de magnesio, de fácil y rápida asimilación en distintos cultivos. Es un constituyente vital de la molécula de clorofila, el cual participa en los procesos fotosintéticos.

COMPOSICIÓN:

RIQUEZAS GARANTIZADAS	
Magnesio (Óxido de Magnesio MgO)	13% P/V
Nitrógeno (N)	9.5% P/V
Manganeso (Mn)	2% P/V
Azufre (S)	1.5% P/V
pH	6
Densidad	1.1 g/mL
Apariencia	Líquido soluble

BENEFICIOS:

La aplicación de magnesio mediante pulverización foliar, refuerza los procesos de maduración en las etapas de crecimiento, moviliza los azúcares en los vegetales y actúa como antioxidante.

PROPIEDADES:

Están principalmente relacionadas a su capacidad para interactuar fuertemente con los ligandos nucleofílicos, en plantas. Forma complejos ternarios con enzimas en los cuales las fuentes catiónicas son requeridas para establecer una geometría precisa entre la enzima y el sustrato. RUBP carboxilasa (Ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Nombre comercial: VITALIK - MgO
- Tipo: Corrector de carencias
- Uso: Agrícola
- Presentaciones: 1L, 5L, 20 Lts y 200 Lts.
- Dosis por aplicación: 500 cc - 1000 cc por cada 200 Lts de agua.

COMPATIBILIDAD:

Puede ser mezclado con otros agroquímicos, salvo indicación contraria.

ALMACENAJE:

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis cc/200Lt.	Dosis Lt./Ha.	Recomendaciones
MAÍZ TRIGO, CEBADA, ARROZ.	500-1Lt. 1-2 Lt.	1.25 2.5	Al inicio del crecimiento. Al inicio de la floración hasta el fin de la maduración.
OLIVO, GIRASOL, MANÍ, ALGODÓN.	500-1Lt. 1-2 Lt.	1.25 2.5	Al inicio del crecimiento. Al inicio de la floración hasta el fin de la maduración.
PAPA.	500-1Lt. 1-2 Lt.	3-5	Al inicio del crecimiento. Al inicio de la floración hasta el fin de la maduración.
CAÑA DE AZÚCAR.	500-1Lt. 1-2 Lt.	1.25 2.5	Aplicar a las 5 hojas verdaderas.
ZAPALLO.	500-1Lt. 1-2 Lt.	1.25 2.5	Aplicar al inicio del brote/floración hasta el final de la maduración.
SANDÍA, TOMATE, AJÍ, FRIJOL, VAINITA, ARVERJA, LECHUGA, CABOLLA, APIO, PEPINILLO.	1-2 Lt.	2.5	Aplicar durante el período de crecimiento.
CÍTRICOS, PALTO, DURAZNO, MANGO, FRESA, MARACUYÁ, UVAS.	1-3 Lt.	5	Aplicar antes de la floración y después del cuajado.